



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 10 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.6 - 28°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 148.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 72.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 48.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-15/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 16-21/10, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng 17-18/10 Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.5	26.4	28.9	72.9
Trong tuần	28.0	23.6	25.8	221.6
Tuần tới	27.6	24.2	25.9	225.8

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 10 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa hè thu: đã thu hoạch xong, lúa mùa sớm và chính vụ giai đoạn trổ - chín - thu hoạch, lúa mùa muộn ở giai đoạn trổ - chín. Đây là thời kỳ cây lúa mẫn cảm nhất với điều kiện ngoại cảnh, nhất là nhiệt độ, thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28-30°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 23.6 - 28°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng đáng kể so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, bệnh thối rễ. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp không thay đổi nhiều, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 1 tháng 10 dao động từ 23.6 - 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần

lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh trắng lá, rệp sáp đỏ; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa tăng không đáng kể so với tuần này, dao động từ 24.2- 27.6°C, lượng mưa tăng khoảng 4mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đo điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.6 - 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm, theo số liệu khí tượng dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp thay đổi không đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh héo rũ, ong ăn lá, sâu đục ngọn, bọ hung nâu.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn thu hoạch, một số diện tích đang trong giai đoạn cây con và phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, theo số liệu thực đo, nền nhiệt trong tuần dao động từ 23.6 - 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần sau thay đổi không đáng kể so với tuần này, người dân cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô: đang trong nhiều giai đoạn khác nhau: gieo hạt, 7 lá, xoáy nõn, trổ cờ. Nhiệt độ tuần này dao từ 23.6 - 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa và nhiệt độ tăng không đáng kể, người dân cần chủ động lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết mưa nhiều, ngập úng, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C - 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là rau ngót, cà chua, cải ngồng, đậu ván tím... Nhiệt độ trung bình tuần này là 25.8 °C, giảm so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa thay đổi không đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 23.6 - 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 221.6mm, phù hợp cho cây phát triển. Chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo, điều kiện khí hậu tuần kế tiếp không thay đổi nhiều so với tuần này; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.2 - 27.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.9°C, tổng lượng mưa là 225.8mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ và lượng mưa thay đổi không đáng kể, tổng lượng mưa khá lớn, người dân cần chủ động thoát nước cho đồng ruộng sau khi mưa lớn xảy ra và tiếp tục sử dụng các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng