



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 9 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 9 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 216.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 21.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 99mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 38.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-11/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng ngày 05/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 08-11/10 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.9	26.1	28.5	289.7
Trong tuần	31.5	26.4	28.9	72.9
Tuần tới	29.6	26.2	27.9	171.9

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 9 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa hè thu trong giai đoạn chín - thu hoạch, lúa mùa sớm và chính vụ trong giai đoạn trổ - chín và lúa mùa muộn ở giai đoạn đứng cái - làm đòng. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần giảm mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp giảm trong khi lượng mưa tăng đáng kể, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh thối thân, nhện gié.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 9 dao động từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cần mía gốc, bươm trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ giảm so với tuần này, dao động từ 26.2- 29.6°C, lượng mưa tăng khoảng 100mm, cần chú ý một số loại sâu

bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh trắng lá, rệp sáp đỏ.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế giảm trong khi lượng mưa tăng mạnh cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông, sâu đục ngọn, bọ hung nâu.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau giảm nhẹ và lượng mưa tăng mạnh, do đó cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp.

Ngô: diện tích ngô đang trong giai đoạn trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa tăng đáng kể và nhiệt độ giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là xúp lơ xanh, lơ trắng, cải xanh... Nhiệt độ trung bình tuần này là 28.9 độ C, tăng nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ giảm (gần 1 độ C), lượng mưa tăng mạnh (100mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang ở giai đoạn phát triển quả - thu hoạch . Nhiệt độ tuần dao động từ 26.4 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 72.9mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thán thư, nhện. Nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng giảm và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 26.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C, tổng lượng mưa là 171.9mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm trong khi lượng mưa tăng đáng kể, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc và chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng