



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 11 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 16.3 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19°C, tổng lượng mưa là 4.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 18.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 11.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 4.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi trời rét. Từ đêm 15-17/11, có mưa vài nơi; riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.7	17.3	20.5	23.5
Trong tuần	21.7	16.3	19.0	4.8
Tuần tới	26.5	15.8	21.1	16.1

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 01 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: toàn bộ diện tích lúa mùa khu vực Đông Bắc đã thu hoạch xong. Do đó, người dân tiếp tục tập trung dọn dẹp đồng ruộng, tiêu trừ mầm bệnh, chuẩn bị đất nền cho vụ sau. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 16.3 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19°C, tổng lượng mưa là 4.8mm. Thời kỳ cải tạo đất nền là thời kỳ cỏ dại phát triển tương đối nhanh, do đó, người dân cần có biện pháp cải tạo đất nền hiệu quả, đảm bảo tiêu diệt được mầm mống dịch hại và một phần cỏ dại có trên đồng ruộng đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ lúa tiếp theo. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, trong tuần tới cần tiếp tục lưu ý cỏ dại có khả năng phát triển.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này vải tiếp tục giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 16.3 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19°C, tổng lượng

mưa là 4.8mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh: bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 16.3 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19°C, tổng lượng mưa là 4.8mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 21.1 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo tăng (khoảng 10mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp.

Cây ngô: Ngô đông trong khu vực đang ở giai đoạn 7 lá - xoáy nõn - trở cờ , nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 16.3 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19°C, tổng lượng mưa là 4.8mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối thấp so với thang nhiệt độ phù hợp với phát triển của ngô; giai đoạn phát triển này của cây ngô cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp như: bệnh thối thân, sâu cắn lá; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh: bệnh mốc hồng hạt ngô, bệnh thối rễ.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 16.3 - 21.7°C, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhảy. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 21.1°C và lượng mưa tăng khoảng 10mm, người dân cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa, sâu tơ.

Cây lạc: đang ở giai đoạn phát triển thân lá, ra hoa và hình thành quả non. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng sinh thực. Theo số liệu thống kê, nhiệt độ tuần này dao động từ 16.3 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 19°C, tổng lượng mưa là 4.8mm, cần lưu ý: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm. Theo số liệu dự

báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.8 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 16.1mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, các cây trồng cần được lựa chọn biện pháp chăm sóc và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng