



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC TÂY BẮC  
Tuần 3 tháng 10 năm 2020**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 16 - 25°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 73.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.1^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.6°C, tuy nhiên, cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 94.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 24.3$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 50.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 7.4$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/10-08/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 02/11 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 09-11/11, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.5	17.8	21.2	167.9
Trong tuần	25.0	16.0	20.5	73.1
Tuần tới	24.8	14.4	19.6	22.2

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 10 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa mùa đã thu hoạch xong. Do đó, thời gian này người dân tập trung dọn dẹp đồng ruộng, tiêu trừ mầm bệnh, chuẩn bị đất nền cho vụ sau. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Chú ý tập trung dọn dẹp sạch đồng ruộng, loại bỏ các mầm bệnh và cỏ dại có khả năng phát sinh, chuẩn bị đất nền tốt cho vụ kế tiếp.

Cây ngô hè thu đang trong giai đoạn thu hoạch; Ngô đông đang trong giai đoạn gieo – 7 lá – xoáy nõn. Ngô là loại cây có thể phát triển trong điều kiện nhiệt độ 20 - 30°C. Trong tuần nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 16 -25°C, lượng mưa của khu vực 73.1mm, khá thích hợp cho cây việc thu hoạch các diện tích ngô đã cho thu hoạch. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc người dân cần lưu ý: Đối với các diện tích ngô đã cho thu hoạch, cần tranh thủ thu hoạch khi thời tiết tạnh ráo để dọn ruộng, tiêu trừ các loại mầm bệnh, cỏ dại có khả năng phát sinh, xới xáo lại ruộng đất chuẩn bị đất nền tốt cho vụ tiếp theo; Đối với các diện tích ngô còn lại đang trong giai đoạn gieo – 7 lá – xoáy nõn, đây là thời kỳ cây ngô rất cần nước, vì vậy cần kịp thời bổ sung thêm nguồn nước cũng như phân bón cho cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ

diễn biến sâu bệnh hại (Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp...) để kịp thời có các biện pháp xử lý tránh gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng ngô.

Cây họ lạc: đang trong giai đoạn gieo – 3 lá, phân cành – đâm tia. Trong tuần nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 16 -25°C, lượng mưa của khu vực 73.1mm, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa của khu vực khá nhỏ. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Trong quá trình chăm sóc người dân cần lưu ý thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời bổ sung thêm nguồn nước, phân bón cho cây, thường xuyên xới xáo rãnh ruộng giúp đất đai tơi xốp tạo điều kiện cho cây lạc dễ dàng đâm tia vào lòng đất. Đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sinh vật hại như bệnh lở cổ rễ, sâu ăn lá, sâu xanh, nhện gié,..phát sinh gây hại.

Cây mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh – vươn lóng. Trong tuần nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 16 -25°C, lượng mưa của khu vực 73.1mm, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho cây mía sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên, lượng mưa thấp. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước và phân bón cho cây mía sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như sâu đục thân, bệnh bã trầu, bệnh trắng lá mía,..phát sinh gây hại

Cây ăn quả có múi (cam Hòa Bình): đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Trong tuần nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 16 -25°C, lượng mưa của khu vực 73.1mm, điều kiện nhiệt độ khá thích hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước và phân bón cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại như sâu đục thân, sâu đục cành, bệnh vàng lá, nấm, muội,..phát sinh gây hại.

Cây mận Sơn La: đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Trong tuần nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 16 -25°C, lượng mưa của khu vực 73.1mm khá thích hợp cho cây mận sinh trưởng và phát triển. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước và phân bón cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cần lưu ý, tỉa bỏ các cành già cỗi, cành sâu bệnh, cành la, cành kém phát triển tạo điều kiện cho các cành khỏe sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh như sâu đục thân, sâu đục cành...phát sinh gây hại.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Trong tuần nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 16 -25°C, lượng mưa của khu vực 73.1mm, điều kiện thời tiết khá thích hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 14.4 – 24.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực không đáng kể 22.2mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung

thêm nguồn nước và phân bón cân đối và hợp lý cho cây. Đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh như bệnh thối búp, bệnh phồng lá, sâu đục thân cành,...phát sinh gây hại.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 14.4 - 24.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.6°C, tổng lượng mưa là 22.2mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm nhẹ, mưa không đáng kể, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ nguồn nước, phân bón và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**