

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần: 1 tháng 5 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê các yếu tố khí tượng khu vực Đông Bắc cho thấy, nhiệt độ tuần này dao động từ 21.8-28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 19.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C song cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 6.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C, lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C với mức độ biến động khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng -45mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 6.5\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1mm với mức độ biến động khoảng $\pm 6.4\text{mm}$.

Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^\circ\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.1	16.5	18.8	100.2
Trong tuần	28.8	21.8	25.3	19.6
Tuần tới	32.3	23.9	28.1	21.7

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 5 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây Vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc, vải đang trong giai đoạn phát triển quả mạnh, một số khu vực đã thu hoạch, nhiệt độ cần cho sự sinh trưởng phát triển của vải là từ 24 - 29°C, cây vải không bị ảnh hưởng khi nhiệt độ tới 40°C, nhiệt độ không quá cao và ẩm độ không khí lớn là điều kiện thuận lợi cho quả vải phát triển, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này và tuần tới thích hợp cho vải phát triển, tuy nhiên, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trong giai đoạn này chủ yếu: bọ xít xanh, bọ xít vai nhọn, châu chấu, rệp hại hoa, sâu đục cuống quả.

Cây Lạc: Thời kỳ này thu hoạch lạc vụ Đông - Xuân, cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33°C, trong khi nhiệt độ tuần này và tuần tới dao động từ 21- 32°C, thuận lợi cho lạc phát triển, tuần này lượng mưa khá nhỏ nên cần chú ý cung cấp đủ nước cho lạc phát triển tốt. Ngoài ra, cần lưu ý một số loài sâu bệnh chủ yếu trên cây lạc là: sâu khoang, sâu cuốn lá, bệnh hại lạc.

Lúa trà chính vụ trong giai đoạn ngâm sữa, lúa trà muộn giai đoạn làm đòng, điều kiện khí hậu thuận lợi cho giai đoạn này nhiệt độ thích hợp nhất là 25-32°C, nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa, với số liệu thống kê, có thể thấy tuần này có điều kiện khí tượng thích hợp cho lúa phát triển, tuy nhiên, cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là: bệnh lép hạt, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn cổ bông.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ ra hoa kết trái, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này mưa tương đối ít, nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây ăn quả. Tuy nhiên, cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành, bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, diệt cỏ dại, dùng thuốc trừ sâu bệnh.

Cây ngô: Ngô xuân đang trong giai đoạn thu hoạch, thời tiết hiện nay khá thích hợp cho quá trình thu hoạch ngô trong vùng, trong giai đoạn này chú ý bệnh sâu keo mùa thu hại ngô.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ được trồng từ đầu tháng 5, nhiệt độ cao nên trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển mạnh.

Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng 23.9 - 32.3°C và lượng mưa dự báo là 21,7mm, có thể nhận thấy xu

thể nền nhiệt tăng và lượng mưa dự báo không đáng kể, do đó nhìn chung các cây trồng trong khu vực cần chú ý cung cấp đầy đủ nước và lưu ý các biện pháp phòng chống sâu bệnh cho phù hợp với thời tiết nắng nóng.

NGƯỜI THỰC HIỆN




Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT




Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

