



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 7 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 27.8 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4°C, tổng lượng mưa là 14.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 44.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 4.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 31.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 10.2 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-27/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 27-31/7, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	35.1	27.9	31.5	58.9
Trong tuần	35.1	27.8	31.4	14.1
Tuần tới	35.1	30.5	32.8	45.5

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 7 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: diện tích lúa mùa và lúa mùa sớm khu vực đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đẻ rộ; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là $25-32^{\circ}$ C, có thể nhận thấy nền nhiệt độ tuần này tương đối cao, dao động từ $27.8 - 35.1^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 31.4° C, bất lợi cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Điều kiện thời tiết tuần này phù hợp với một số đối tượng sinh vật phát triển gây hại cho lúa như: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng tăng, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ dự báo tuần tới không phù hợp giai đoạn phát triển của lúa hè thu, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa giai đoạn làm đòng, đòng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này mưa giảm so với tuần trước, tổng lượng mưa là 14.1mm, nhiệt độ tương đối cao trong khoảng từ 27.8° C đến 35.1° C, không thật sự có lợi cho giai đoạn này của cây ăn quả, do đó, người dân cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng trong khu vực. Với giai đoạn sinh trưởng phát triển hiện tại của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như bọ xít xanh, sâu vẽ bùa, có thể

áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, dùng thuốc trừ sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 32.8°C, lượng mưa tăng khoảng 30mm là điều kiện một số sâu bệnh phát triển như: bệnh vàng lá, bệnh cháy gôm.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phát triển trở cờ, phát triển bắp; thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 31.4°C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; một số bệnh phổ biến: sâu đục thân, bệnh khô vằn. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ (trên 1 độ C) đồng thời tổng lượng mưa cũng tăng, do đó lưu ý bệnh đốm là nhỏ và rỉ sắt tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích ngô trong khu vực.


Cây nhãn: Giai đoạn tuần 2 tháng 7, nhãn bước vào giai đoạn thu hoạch mạnh. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 7 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 27.8 - 35.1°C và lượng mưa là 14.1mm, phù hợp cho nhãn phát triển quả và thu hoạch. Tuy nhiên, cần lưu ý bệnh cháy lá, bệnh thối rễ trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Diện tích nhãn các tỉnh trong khu vực đã bước vào thu hoạch mạnh, riêng nhãn lồng thu hoạch muộn hơn, theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp tăng không đáng kể cùng với lượng mưa tăng nhẹ là điều kiện thích hợp cho giai đoạn kế tiếp của nhãn trong tuần tới, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như sâu đục thân, bệnh thán thư, bệnh cháy lá.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần này tương đối cao, dao động từ 27.8 - 35.1°C, khoảng nhiệt độ phù hợp với quá trình phát triển của chè, tuy nhiên lượng mưa tuần này không nhiều, do đó, cần chú ý cung cấp đủ nước cho chè. Tuy nhiên, theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ đồng thời lượng mưa có xu hướng tăng (khoảng 30mm), là điều kiện cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh mạnh như sâu cuốn lá non, sâu cuốn búp, sâu róm.

Cây rau màu: đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 7 có nền nhiệt độ tương đối cao, dao động từ 27.8 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, do đó trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý bệnh sâu tơ, sâu xám, sâu xanh trên các loại rau màu trong khu vực. Dự báo tuần tới nhiệt độ có xu hướng tiếp tục tăng nhẹ, cần lưu ý một số bệnh có khả năng phát sinh như bệnh nhện đỏ, bọ phấn.


Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 30.5 - 35.1°C, nhiệt độ dự báo trung bình khoảng 32.8°C, lượng mưa dự báo tuần kế tiếp giảm còn trên 15mm, do đó các cây trồng cần được chú ý biện pháp chống nắng thích hợp, phòng chống dịch bệnh phát triển trên nền nhiệt cao hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng