



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 8 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.2 - 32°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.6°C, tổng lượng mưa là 290.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 263.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 67.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 245.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 12.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 13-15/8, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ 16-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Từ ngày 19-21/8, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	36.4	26.3	31.3	26.3
Trong tuần	32.0	27.2	29.6	290.2
Tuần tới	33.5	29.1	31.3	45.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa hè thu trong giai đoạn làm đòng - trổ - chín, thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28-30 độ C. Lúa mùa sớm và chính vụ giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ, nhiệt độ thích hợp giai đoạn này là 25-32 độ C. Lúa muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh, với nhiệt độ thích hợp là 25-32°C. Tuần này nhiệt độ dao động từ 27.2 - 32°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.6°C, tổng lượng mưa là 290.2mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần khá lớn, điều kiện thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần lưu ý sâu bệnh chính là: bọ trĩ, sâu đục thân hai chấm. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh (tổng lượng mưa dự báo 45.0mm), do đó, cần chú ý cung cấp đủ nước cho cây trồng, lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong tuần kế tiếp: bệnh sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu.

Mía: tiếp tục giai đoạn cây con, nhiệt độ tốt nhất là 20-25°C, nhiệt độ tuần 1 tháng 8 dao động trong dao động 27.2 - 32°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.6°C,

tổng lượng mưa là 290.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do mưa nhiều, cần lưu ý một số loại bệnh chủ yếu như bệnh cháy lá, bệnh xoắn cổ lá, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời. Dự báo tuần tới nhiệt độ tăng so với tuần này, dao động từ 29.1- 33.5°C, lượng mưa giảm mạnh, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây trồng và chú ý một số loại bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết này: bệnh thối đỏ, bệnh than.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, đồng thời lượng mưa có xu thế giảm đáng kể; cần lưu ý một số loại bệnh: bệnh phấn trắng, bệnh bồ hóng.

Sắn: đang trong giai đoạn hình thành củ và phát triển củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động trọng khoảng 27.2 - 32°C phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu: bệnh khảm lá do vi rút. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng và lượng mưa giảm mạnh, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho quá trình thu hoạch sắn trên các diện tích cây trồng trong khu vực; cần tiếp tục lưu ý bệnh thối củ và rệp sáp bột hồng.

Ngô: đang trong giai đoạn gieo, 5 lá, xoáy nón - trở, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 27.2 - 32°C với lượng mưa tổng tương đối cao 290.2mm, do đó người dân cần lưu ý đảm bảo thoát nước kịp thời cho ruộng ngô. Cần lưu ý sâu đục thân, sâu xám thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm mạnh và nhiệt độ tăng so với tuần này, do đó người dân cần lưu ý bệnh rệp muội và khô vằn.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc các khu vực gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là mồng tơi, mướp, cải... Nhiệt độ trung bình tuần này là 29.6 độ C, giảm nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: sâu tơ, sâu xanh bướm. Theo dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (gần 2 độ C), lượng mưa giảm mạnh (45.0mm), cần lưu ý một số bệnh trên rau màu như: bọ nhảy, ròi hại rễ.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang trong giai đoạn quả non. Nhiệt độ tuần này dao động từ 27.2 - 32°C, với lượng mưa 290.2mm, lượng mưa lớn không thực sự phù hợp giai đoạn phát triển quả non trên cây có múi. Nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo giảm đáng kể, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây ăn quả và một số loại sâu bệnh chính như: sâu vẽ bùa, bọ xít xanh.


Thống kê Bảng 1 cho thấy tuần tới nhiệt độ dao động trong khoảng 29.1 đến 33.5°C, nhiệt độ trung bình 31.3°C và lượng mưa dự báo là 45.0mm; cần chú ý lựa chọn các biện pháp chống nóng và cung cấp đủ nước cho cây trồng, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng