



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 8 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.2 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.2°C, tổng lượng mưa là 182.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.2^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 57.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 45.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 71.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 12.4 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 23-25/8, có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 25-31/8, có mưa rào và dông rải rác (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: TTDBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.8	27.5	29.6	239.9
Trong tuần	32.3	26.2	29.2	182.1
Tuần tới	33.4	29.3	31.3	110.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê diện tích lúa mùa sớm đang giai đoạn phát triển đòng và trổ; lúa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ, phân hoá đòng; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C, nên nhiệt độ tuần này dao động từ 26.2 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.2°C, tổng lượng mưa là 182.1mm, không thực sự phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Điều kiện thời tiết tuần này cũng phù hợp với một số đối tượng sinh vật phát triển gây hại cho lúa như: bệnh bạc lá, cỏ dại phát triển, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ dự báo tuần tới không thật sự phù hợp giai đoạn phát triển của lúa mùa, lượng mưa lớn có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa giai đoạn trổ bông, đồng thời cần lưu ý một số loại sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này tuy lượng mưa giảm so với tuần trước, nhưng tổng lượng mưa vẫn tương đối lớn 182.1mm, nhiệt độ trong khoảng từ 26.2°C đến 32.3°C, tương đối có lợi cho giai đoạn này của cây ăn quả. Với giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây ăn quả có múi cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ

không khí trung bình tăng lên 31.3°C, lượng mưa giảm khoảng 80mm, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh loét, bệnh vàng lá.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phát triển phát triển bắp và thu hoạch; thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 29.2°C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; một số bệnh phổ biến: bệnh bạch tạng, bệnh thối rễ. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ (gần 2°C), đồng thời tổng lượng mưa dự báo có xu thế giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá, rệp muội.


Cây nhãn: hầu hết diện tích trồng nhãn tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 8 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 26.2 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.2°C, tổng lượng mưa là 182.1mm. Lượng mưa có giảm so với tuần trước nhưng vẫn tương đối cao, nhãn có thể bị rụng quả khi có mưa lớn xảy ra. Cần lưu ý bệnh sâu đục thân, sâu đục cuống quả trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp tăng nhẹ cùng với lượng mưa giảm là điều kiện thích hợp cho giai đoạn kế tiếp của nhãn trong tuần tới, cần lưu ý một số loại sâu bọ xít nâu, bệnh sương mai.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.2 - 32.3°C, khoảng nhiệt độ tương đối phù hợp với quá trình phát triển của chè. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ đồng thời lượng mưa có xu hướng giảm (khoảng 80mm), là điều kiện cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh mạnh như nhện đỏ tươi, nhện sọc trắng.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 8 có nhiệt độ dao động từ 26.2 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.2°C, do đó trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý sâu khoang, sâu tơ, sâu xám trên các loại rau màu trong khu vực. Dự báo tuần tới lượng mưa có xu hướng giảm mạnh, cần lưu ý một số bệnh có khả năng phát sinh như bệnh thối búp chè, bệnh đốm nâu, khô lá chè.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 29.3 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 110.4mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp điều kiện thời tiết và các phương pháp ứng phó sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng