



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 8 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 22.7 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 114.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 107.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 37 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 57.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 02-06/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 05/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, từ ngày 03-05/9 có nắng nóng; Từ đêm 06-10/9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ 11-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.0	21.8	24.4	221.8
Trong tuần	28.9	22.7	25.8	114.6
Tuần tới	32.6	27.0	29.8	57.2

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: diện tích lúa mùa sớm đang giai đoạn trổ bông – ngậm sữa – chắc xanh, lúa chính vụ - muộng đang trong giai đoạn đứng cái – làm đòng – trổ, lúa nương (lúa 1 vụ) đang trong giai đoạn chắc xanh – chín – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9 $^{\circ}\text{C}$ và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6 $^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần lưu ý, đối với các diện tích lúa đang trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần khẩn trương tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để thu hoạch và dọn sạch đồng ruộng; đối với các diện tích lúa còn lại cần kịp thời bổ sung nguồn nước và phân bón cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt giúp đạt năng suất và chất lượng cao. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn, lem lép hạt, chuột,... tiếp tục gây hại.

Ngô hè thu sớm đang trong giai đoạn phát triển bắp – thu hoạch. Ngô phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ ngày từ 24 - 30 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ > 38 $^{\circ}\text{C}$ ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9 $^{\circ}\text{C}$ và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm, khá thuận lợi cho

cây ngô sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C , lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn thu hoạch cần tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo thu hoạch và dọn dẹp đồng ruộng chuẩn bị cho vụ tiếp theo; đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước và phân bón cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại: sâu keo mùa thu, sâu gai, sâu đục bắp, sâu đục thân, sâu ăn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn bệnh huyết dụ.... gia tăng gây hại cục bộ.

Cây họ đậu (lạc, đậu tương): đang trong giai đoạn quả già – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9°C và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm, tương đối thuận lợi cho cây họ đậu sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm, vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo để thu hoạch và dọn dẹp những diện tích cây đã cho thu hoạch, kịp thời bổ sung đủ nguồn nước và phân bón cho cây đang trong giai đoạn quả già. Đồng thời, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh thối rễ,..gây hại.

Cây rau màu: đang trong các giai đoạn cây con - phát triển thân lá – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9°C và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm, thuận lợi cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm, vì vậy cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước, phân bón và chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng cho cây. Đồng thời, cần đặc biệt lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại: Sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá,...để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây sắn: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ. Sắn là loại cây chịu được điều kiện khô hạn và có thể trồng được ở các vùng khí hậu có lượng mưa thấp, tuy nhiên cây sắn không chịu được ngập úng. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây sắn sinh trưởng và phát triển tốt từ 23-27 °C. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9°C tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm. Cần lưu ý bệnh khảm lá sắn, rệp sáp, bệnh thối củ,... tiếp tục gây hại và có khả năng phát sinh gây hại gia tăng.

Cây chè (chè Thái Nguyên): đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9°C và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm tương đối thuận lợi cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm

khá phù hợp với quá trình phát triển của chè. Cần lưu ý đối tượng bọ xít, rầy chổng cánh, nhện gié,... tiếp tục gây hại và có khả năng phát sinh gây hại mạnh.

Cây ăn quả có múi (cam Hà Giang): vườn kinh doanh đang trong giai đoạn phát triển quả, một số diện tích đang trong giai đoạn cuối thu hoạch; vườn kiến thiết đang trong giai đoạn phát triển thân lá. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9°C và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm tương đối thuận lợi cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm, khá thuận lợi cho cây ăn quả có múi phát triển nhất là các vườn cây ăn quả đang cho thu hoạch, tuy nhiên chú ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại: Nhện đỏ, nhện trắng, râm vàng, rầy chổng cánh, rệp hại, bệnh loét, bệnh thán thư, bệnh vàng lá, thối rễ,...

Cây nhãn: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7-28.9°C và tổng lượng mưa của khu vực đạt 114.6mm, tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 27.0-32.6°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 57.2mm, thuận lợi cho các diện tích nhãn bước vào giai đoạn thu hoạch cho năng suất và chất lượng chất lượng tốt. Lưu ý khẩn trương thu hoạch các diện tích nhãn đã chín, tĩa bỏ ngọn, các cành già cỗi, cành sâu bệnh đồng thời chú ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại: bọ xít nâu, bệnh xương mai, nhện lông nhung,... gây hại rải rác.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 27 - 32.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.8°C, tổng lượng mưa là 57.2mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng mạnh, mưa không đáng kể, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm bổ sung đủ nguồn nước, phân bón và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng