



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 11 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 15.7 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 44.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 49.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 13.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 34.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 16 đến ngày 17/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng thời kỳ ngày 12-13/11 và từ 17-18/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.7	16.8	19.2	93.6
Trong tuần	19.8	15.7	17.7	44.5
Tuần tới	24.0-27.0	15.0-18.0	19.5-22.5	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: diện tích lúa mùa trong khu vực đã thu hoạch xong.

Cây lạc: giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 15.7 - 19.8 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.7 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 44.5mm. Sâu bệnh chính trong giai đoạn này là bệnh đốm lá muện, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara (pha 25-30 g/ha, 1g/bình 8 lít nước), Cyperan 10EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối dự báo trong khoảng 15.0-17.0 $^{\circ}\text{C}$ và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: sâu ăn tạp, sâu ăn lá.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Bắc Ninh, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn chăm sóc - phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 15.7 - 19.8 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 17.7 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 44.5mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25EC; Sutin 5EC; Oshin 20WP; Cruiser plus 312,5PS, ... Số liệu dự báo tuần tới cho thấy nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 19.5-22.5 $^{\circ}\text{C}$ và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần chú ý đảm bảo nước cho cây trồng, lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 15.7 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 44.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng riêng lẻ (không phối trộn) và luân phiên một trong các loại thuốc thuộc nhóm cúc tổng hợp và dầu khoáng như Cypermethrin, Deltamethrin, có thể phối hợp thuốc nhóm cúc tổng hợp với dầu khoáng để tăng tính hiệu quả và hạn chế tính kháng thuốc. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 19.5-22.5°C, lượng mưa dự báo giảm (khoảng 30mm) cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh thán thư, nhện.

Cây ngô: vụ đông ở giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 15.7 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 44.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dùng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân chuồng bón cho ngô, lượng dùng 80 – 100 kg/ha, phun trừ bệnh bằng thuốc Validamicin 3 SC, pha nồng độ 0,2-0,25%. Dự báo tuần tiếp nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C, lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 30mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu ăn lá.

Cây rau màu: vụ đông đang trong giai đoạn cây con và phát triển thân lá, thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 15.7 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 44.5mm. Có thể thấy nhiệt độ tối thấp khoảng 15 độ C, cây trồng vụ đông cần đảm bảo biện pháp chống rét như: tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ, phân NPK để cây ra thêm rễ mới, sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết đồng thời cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC,... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.5-22.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhảy.

Cây sắn: đang giai đoạn tích lũy tinh bột. Thống kê số liệu khí tượng từ một số trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 15.7 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 44.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như sùng trắng, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim (thuốc Carmanthai 80 WP), hoặc Kasumin. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 19.5-22.5°C và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.5-22.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt và lượng mưa giảm, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C, do đó, các cây trồng cần có biện pháp chống rét hiệu quả như: tưới đủ ẩm; bón thêm phân kali, phân lân kết hợp tủ gốc bằng mùn, rơm, rạ... để giữ ẩm, giữ ấm cho cây và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng