



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Tuần 2 tháng 11 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 38.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/11-01/12, có mưa vài nơi, từ ngày 25/11-01/12 ngày nắng. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.8	15.7	17.7	44.5
Trong tuần	20.3	15.2	17.7	5.6
Tuần tới	23.0-26.0	12.0-16.0	17.5-21.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây sắn: đang trong giai đoạn thu hoạch, thống kê số liệu các trạm trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc có Carbendazim hoặc Kasumin. Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-21.0°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, bệnh chổi rồng.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Đến thời điểm hiện nay, diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê số liệu từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, nhện lông nhung; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ridomi gold 68WP nồng độ 0,2%; Aliette 800 WP nồng độ 0,2 % ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp dao động trong khoảng 12.0-16.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Aliette 80WP, Ridomil MZ 72WP, Ridomil Gold 68 WP ... Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-21.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: đang ở giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Tilt 250ND và Anvil 5SC nồng độ 0,1%. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 12.0-16.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại.

Cây rau màu: khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Azadirachtin, Emamectin Benzoate,... đồng thời có biện pháp chống rét cho rau màu khi nhiệt độ giảm xuống 15 độ C như ủ rơm rạ, phủ nilon chống rét và sương muối. Theo số liệu dự báo tuần tới lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-21.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây lạc: đang giai đoạn phát triển thân lá. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này khu vực Đông Bắc có nhiệt độ dao động từ 15.2 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.7°C, tổng lượng mưa là 5.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước, Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước ... Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 12.0-16.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0 - 26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 12.0-16.0°C,


nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-21°C, tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, do đó các cây trồng cần được chú ý biện pháp phòng chống rét hiệu quả như phủ nilong, ủ gốc bằng rơm rạ đặc biệt trên diện tích rau màu mới gieo trồng; đảm bảo tưới đủ ẩm và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như N, P, K để tăng khả năng chống rét cho cây trồng và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng