



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
Tuần 2 tháng 11 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 22.9 - 25.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.1°C, tổng lượng mưa là 425.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 354.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 141.8\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 225.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 33.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Đêm 21/11, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 22-24/11, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 25-26/11, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 27/11-01/12, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.9	21.5	23.7	71.3
Trong tuần	25.4	22.9	24.1	425.4
Tuần tới	26-29	19-22	22.5-25.5	100-300

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây ngô: đang trong giai đoạn phát triển thân lá - trổ cờ. Cây ngô sinh trưởng thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-30 $^{\circ}\text{C}$. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, trong tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần trước; lượng mưa tuần này của khu vực có cùng xu thế tăng mạnh so với tuần trước; Cụ thể: nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 24.1 $^{\circ}\text{C}$ (tăng 0.4 $^{\circ}\text{C}$ so với tuần trước, tuần trước nhiệt độ không khí trung bình đạt 23.7 $^{\circ}\text{C}$), lượng mưa tuần này của khu vực đạt 425.4mm (tăng 354.1mm so với tuần trước, tuần trước lượng mưa đạt 71.3mm). Thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây ngô (nhất là các diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ). Trong tuần, cây ngô chịu tác động của một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu keo mùa thu, bệnh thối thân, bệnh gỉ sắt... Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 19-29 $^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 100-300mm. Trong quá trình chăm sóc cần chú ý tình hình thời tiết để có các biện pháp tiêu thoát nước cho cây ngô hợp lý.

Cây lạc vụ mùa: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – ra hoa. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh từ 24-33 $^{\circ}\text{C}$. Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 24.1 $^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt

425.4mm, điều kiện thời tiết tuần này của khu vực không thuận lợi cho sinh trưởng của cây lạc. Cần chú ý thực hiện các biện pháp để tiêu thoát nước kịp thời cho cây lạc. Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: Sâu xám, sâu xanh, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ..., người dân cần chú ý theo dõi diễn biến bệnh (trường hợp mật độ sâu bệnh hại thấp, người dân có thể sử dụng các biện pháp thủ công như dùng vợt để chao hoặc bắt tay; trường hợp mật độ sâu bệnh vượt quá mức độ cho phép cần sử dụng ngay thuốc bảo vệ thực vật để phun phòng trừ). Dự báo, tuần tới, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22.5-25.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 100-300mm. Cần chú ý tiếp tục các biện pháp để tiêu thoát nước cho cây lạc.

Cây sắn: vụ đông xuân 2020-2021 tiếp tục trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch, vụ hè thu 2021 đang trong giai đoạn phát triển thân lá - tạo củ. Cây sắn sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 23-27°C. Tuần 2 tháng 11, khu vực Trung Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất đạt 22.9°C, nhiệt độ trung bình đạt 24.1°C, nhiệt độ cao nhất đạt 25.4°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 425.4mm. Thời tiết mưa nhiều là điều kiện không thuận lợi cho cây sắn phát triển. Trong tuần, bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn. Trong quá trình chăm sóc người dân tiếp tục thu gom tiêu hủy những diện tích đã bị nhiễm bệnh để tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây sắn (nhất là diện tích sắn Hè thu 2021); đồng thời để hạn chế sắn bị bệnh nhằm giữ được những cây sắn khỏe mạnh để làm giống cho vụ sau. Tuần 3 tháng 11, dự báo khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to với lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 100-300mm. Người dân cần chú ý, chủ động các biện pháp để thoát nước kịp thời cho cây sắn trong trường hợp mưa lớn xảy ra.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): tiếp tục trong giai đoạn quả chín - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển từ 23-29°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 22.9-25.4°C, nhiệt độ không khí trung bình đạt 24.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 425.4mm. Thời tiết trong tuần có mưa nhiều khiến cho cây ăn quả có múi sinh trưởng không tốt, làm gia tăng hiện tượng rụng quả. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục quả, bệnh cháy gôm, bệnh loét sẹo, ngài trích hút... Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực đạt 19-29°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 100-300mm, trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hại người dân cần chú ý thoát nước cho cây ăn quả có múi.

Cây cao su: tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Cây cao su phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 25-30°C. Theo số liệu thống kê thực cho thấy, tuần này nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ có xu thế tăng nhẹ so với tuần trước (với mức tăng 0.4°C của nhiệt độ không khí trung bình), lượng mưa trong tuần của khu vực có xu thế tăng mạnh so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 425.4mm, tăng 354.1mm so với tuần trước). Mưa nhiều khiến cây cao su sinh trưởng kém, do đó người dân cần chủ động thoát nước cho cây cao su. Trong tuần, cây cao su chịu tác động của một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh loét sẹo miệng cạo, bệnh rụng lá mùa mưa, bệnh phấn trắng... Dự báo, tuần tới lượng mưa của khu vực dao động trong khoảng 100-300mm, cần chú ý tiếp tục thoát nước cho cây cao su.

Cây hồ tiêu: tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây hồ tiêu sinh trưởng từ 25 – 27°C. Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 24.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 425.4mm. Cây hồ tiêu trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Từ nhiều tuần qua, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến cho sản lượng tiêu thu hoạch được ở Trung Trung Bộ giảm sút. Các đối tượng sâu bệnh hại trên cây tiêu trong tuần: bệnh chết nhanh, bệnh thán thư, bệnh chết chậm... Dự báo tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực dao động từ 19-29°C, lượng mưa của khu vực dao động từ 100-300mm. Cần chú ý, tiếp tục các biện pháp để thoát nước cho cây hồ tiêu.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 19-29°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động từ 22.5-25.5°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 100-300mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về dinh dưỡng, tiếp tục tiêu thoát nước và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng