



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 17.8 - 24.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 11.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 6.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 3.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 11.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ gần sáng ngày 25-26/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét; riêng phía Bắc ngày 26/12 trời rét đậm. Từ ngày 27-30/12, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét; riêng phía Bắc ngày 27-28/12 trời rét đậm. Từ ngày 31/12/2021-01/01/2022, có mưa vài nơi. Trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.0	14.9	18.9	9.8
Trong tuần	24.4	17.8	21.1	11.0
Tuần tới	24.0-27.0	10.0-13.0	17.0-20.0	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Lạc: Diện tích lạc thu đông trong khu vực đang ở giai đoạn ra hoa. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ $17.8 - 24.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C , tổng lượng mưa là 11.0mm, trong tuần cần chú ý một số loại sâu bệnh chính như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước, Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước,... Số liệu dự báo cho thấy tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng $17.0-20.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo trong khoảng 15.0-30.0mm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: bệnh xoắn lá, sâu ăn tạp.

Mía: tiếp tục giai đoạn tích lũy đường với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là $20-25^{\circ}\text{C}$. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ $17.8 - 24.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C , tổng lượng mưa là 11.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh bọ hóng, sâu đục thân mình tím; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc gốc đồng, Chlorothalonil. Dự báo tuần sau nhiệt độ tối thấp trong khoảng $10.0-13.0^{\circ}\text{C}$, cần

lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh thối đở, sâu bốn vạch.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.8 - 24.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 11.0mm và dự báo nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 15.0-30.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển trên cây thông như: bệnh héo rũ, côn trùng cánh cứng.

Sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn tích lũy bột, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.8 - 24.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 11.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim hoặc Kasumin. Theo dự báo nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô vụ đông: đang giai đoạn phun râu, chín sữa, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 22-25°C. Thống kê số liệu khí tượng tuần 2 tháng 12 cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.8 - 24.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 11.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Tilt 250ND và Anvil 5SC nồng độ 0,1%. Dự báo tuần sau lượng mưa trong khoảng 15.0-30.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Rau màu: Diện tích rau vụ thu đông đang ở giai đoạn phát triển thân lá, ra hoa và tạo củ. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là hành củ, cải bắp, súp lơ, su hào... Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 17.8 - 24.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 11.0mm; cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Saikumi 39.35SC, Sec Saigon 25EC, Sape Alpha 5EC, Comda Gold 5WG ... Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 17.8 - 24.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 11.0mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xịt xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole và Difenconazole. Dự báo cho thấy nhiệt độ tối thấp dự báo tuần sau trong khoảng 10.0-13.0, lượng mưa dự báo trong khoảng 15.0-30.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 15.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tối thấp dự báo thấp dưới 15.0°C, do đó cây trồng cần có biện pháp phòng chống rét hiệu quả như: bón thêm phân kali, phân lân kết hợp tủ gốc bằng mùn, rơm, rạ... để giữ ẩm, giữ ẩm cho cây; những ngày có sương muối giá buốt dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới, phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua đồng thời sử dụng biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng