



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.8$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 24-26/12, có mưa, mưa rào, trời rét; riêng ngày 26/12 trời rét đậm. Từ ngày 27/12/2021-01/01/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng ngày 27-28/12 trời rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.7	14.6	19.1	0.1
Trong tuần	24.1	16.0	20.1	1.4
Tuần tới	23.0-26.0	9.0-12.0	16.0-19.0	5.0-10.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Lạc: Thống kê cho thấy đến thời điểm này diện tích lạc đang ở giai đoạn phát triển củ; tổng hợp số liệu từ các trạm khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Proclaim 1.9EC, Limater 7.5EC, Pesta 5SL. Dự báo tuần sau có nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-10.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá, sâu ăn tạp.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng riêng lẻ (không phối trộn) và luân phiên một trong các loại thuốc thuộc nhóm cúc tổng hợp và dầu khoáng như Cypermethrin, Deltamethrin, có thể phối hợp thuốc nhóm cúc tổng hợp với dầu khoáng để tăng tính hiệu quả và hạn chế tính kháng thuốc của sâu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-10.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ ngô vụ đông đang giai đoạn phát triển bắp với nhiệt độ thích hợp từ 22-25°C. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manthane M46, Juliet 80WP phun kỹ, Foraxyl 35 WP,... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0°C, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên, hiện nay nhãn đang trong giai đoạn chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 12 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, bệnh khô cành; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: cắt tỉa, thu gom và đem đi tiêu huỷ (đốt) những cành, lá, hoa có triệu chứng bệnh. Sau đó, phun thuốc trừ nhện khi cây ra nõn non hoa và ngay sau khi cắt tỉa ở mỗi lần thu hoạch bằng các loại thuốc như Confidor, Ortus, Comite... Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-10.0mm và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, cần lưu ý một số loại bệnh như: nhện đỏ, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm trắng, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: dùng cây che mát, tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè khi bọ trĩ rõ, sử dụng thuốc Nouvo 3.6EC,... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ.

Rau màu: Thống kê cho thấy diện tích rau màu vụ thu đông khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đang ở giai đoạn ra hoa và phát triển quả. Tổng hợp số liệu tuần 2 tháng 12 cho thấy nhiệt độ dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validacin, Bonanza, ... Dự báo tuần tới lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn tích lũy tinh bột - thu hoạch. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động từ 16.0 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 1.4mm; cần chú ý một số sâu bệnh như bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim. Số liệu dự báo tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0 độ C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, sùng trắng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-


12.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-10.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ giảm với nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0°C, các cây trồng cần chú ý sử dụng biện pháp chống rét hiệu quả như: Đối với nhóm rau ăn lá cần che bằng nilon trắng để tránh mưa rét. Tỉa thưa hợp lý cành, nhánh (nhất là đối với cây cà chua), làm bộ tán thông thoáng, thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả (cà chua, bí đỏ...). Tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cây trong những ngày rét đậm đồng thời sử dụng các biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**