



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 9 NĂM 2021

Đánh giá chung

Điều kiện khí tượng nông nghiệp ở hầu hết các vùng trong cả nước trong tháng 9 không thực sự thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Lượng mưa lớn, số ngày mưa nhiều, phân bố đều trong tháng, kết hợp với nền nhiệt và số giờ nắng khá, gió tây khô nóng giảm hẳn so với các tháng trước tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên cuối tháng 9 năm 2021 đã xảy ra mưa lớn trên các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, mưa lớn liên tục nhiều ngày đã làm ngập úng diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp; nhiều diện tích lúa và hoa màu đã ngập trắng. Thiệt hại do thiên tai trong tháng 9 chủ yếu do ảnh hưởng của bão, lũ, mưa lớn, lốc xoáy và sạt lở.



Hình a: Biểu đồ tổng lượng mưa tháng 9



Hình b: Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng 9


Lùa mùa: Tính đến cuối tháng 9, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.577,4 nghìn ha. Lúa hè thu: Cả nước gieo cấy ước đạt 1.954 nghìn ha. Tính đến cuối tháng 9, các địa phương đã thu hoạch được 1.643,8 nghìn ha lúa hè thu. Lúa thu đông: Tính đến cuối tháng 9, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 599,7 nghìn ha lúa thu đông. Một số sâu bệnh phát triển trong tháng 9 như: dòi đục thân, bệnh thối rễ, sâu đục trái, bọ xít lưới...

Đặc trưng khí tượng nông nghiệp và đặc trưng nông nghiệp từng khu vực trong cả nước trong tháng 09 năm 2021 cụ thể như sau:

I. Khu vực Bắc Trung Bộ

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Bắc Trung Bộ trong tháng 9 năm 2021, thông báo đã tổng hợp diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như Hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thông kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Bắc Trung Bộ được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021

khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần \ Yếu tố	Nhiệt độ tối cao (độ C)	Nhiệt độ tối thấp (độ C)	Nhiệt độ trung bình (độ C)	Lượng mưa (mm)
Tuần 1	31.3	25.4	28.3	228.2
Tuần 2	32.0	26.1	29.0	193.2
Tuần 3	30.0	24.4	27.2	380.9
Đặc trưng KT tháng 9	32.0	24.4	28.1	802.3

Thông kê Bảng 1 cho thấy nhiệt độ trung bình các tuần dao động từ 27.2 đến 29.0 độ C, nhiệt độ tối cao dao động từ 30.0 đến 32.0 độ C; nhiệt độ tối thấp dao động từ 24.4 đến 26.1 độ C. Tổng lượng mưa dao động từ 193.2 đến 380.9mm.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Bắc Trung Bộ được thông kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Bắc Trung Bộ


Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà sớm	Thu hoạch xong	Nền nhiệt tháng 9 khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm so với nền nhiệt tháng 8 tuy nhiên lượng mưa tăng đáng kể, đến cuối tháng 9 hầu hết diện tích ruộng trồng lúa vụ Hè Thu đã thu hoạch xong, tiến hành thu gom gốc rạ, dọn dẹp làm sạch đồng ruộng.
Ngô	Hè thu	Đóng bắp - thu hoạch	Nhiệt độ trung bình tháng 9 là 28.1 độ C, tổng lượng mưa tháng 9 là 802.3mm. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Ababeter 1.8 EC, 3.6EC, 5EC, Regent 1.8EC...
Mía		Vươn lóng- tích lũy đường	Nền nhiệt trung bình tháng 9 khu vực Bắc Trung Bộ giảm 3.0 độ C so với tháng 8, nền nhiệt thích hợp cho mía phát triển giai đoạn này. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: VN85-1859, R570, QĐ 15, K84-200, ROC 1, ROC 2, ROC 8, ROC 20...
Cây ăn quả		Phát triển quả, thu hoạch	Nền nhiệt trung bình tháng 9 khu vực Bắc Trung Bộ là 28.1 độ C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Sagolex, Bassan, Trebon, Confidor, Cypermethrin,...
Cây rau màu		Các giai đoạn khác nhau	Nền nhiệt tháng 9 khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm so với tháng 8 với nhiệt độ cao nhất tháng 9 là 32.0 độ C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Biocin 8000 SC, Dipel 32 WP ...
Cây thông		Khai thác nhựa	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trung bình tháng 9 trong khu vực khoảng 28.1 độ C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ofatox 400EC, Nitox 30EC...
Cây sắn		Phát triển củ	Nhiệt độ tối cao tháng 9 dao động từ 30.0 đến 32.0 độ C; nhiệt độ tối thấp tháng 9 dao động từ 24.4 đến 26.1 độ C; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Visa 5G, Vifu - Super 5G, Virofos 20EC, ...

II. Khu vực Đông Bắc

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Đông Bắc trong tháng 9 năm 2021, thông báo đã tổng hợp diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như Hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thống kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Đông Bắc được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Đông Bắc

Tuần	Yếu tố	Nhiệt độ tối cao (độ C)	Nhiệt độ tối thấp (độ C)	Nhiệt độ trung bình (độ C)	Lượng mưa (mm)

Tuần 1	28.4	23.3	25.8	104.8
Tuần 2	29.9	23.5	26.7	120.8
Tuần 3	29.1	23.2	26.2	194.8
Đặc trưng KT tháng 9	29.9	23.2	26.2	420.4

Thống kê đặc trưng khí tượng trong bảng trên cho thấy nhiệt độ tối cao dao động từ 28.4 đến 29.9 độ C, nhiệt độ tối thấp dao động từ 23.3 đến 23.5 độ C, nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 25.8 đến 26.7 độ C. Tổng lượng mưa cao nhất vào tuần 3 tháng 9 là 194.8mm.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Đông Bắc được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Đông Bắc


Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà sớm	Chín - thu hoạch	Nhiệt độ tháng 9 có xu hướng giảm so với tháng 8. Nhiệt độ trung bình tháng 9 là 26.2 độ C. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25WG, Asarasuper 250WDG, Wofara 300WG, Onera 300WG...
Ngô	Hè thu	Phát triển bắp	Theo thống kê, nhiệt độ trung bình tuần trong tháng 9 là 26.2 độ C, nên nhiệt phù hợp cho cây ngô phát triển trong giai đoạn này. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Vibasu 10 H, Vicarp 4 H, Vifurasn 3G, Padan 95SP,...
Vải		Phát triển lộc	Bảng thống kê trên cho thấy nhiệt độ trung bình tháng 9 dao động từ 25.8

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			đến 26.7 độ C. Cần lưu ý bệnh sương mai, nhện lông nhung; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ridomi gold 68WP nồng độ 0,2%; Aliette 800 WP nồng độ 0,2 %...
Cây ăn quả		Phát triển quả, thu hoạch	Bảng thống kê cho thấy nhiệt độ cao nhất tháng 9 là 29.9 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole Difenconazole.
Cây rau màu		Các giai đoạn	Theo thống kê, nhiệt độ trung bình tuần trong tháng 9 dao động từ 25.8 đến 26.7 độ C, điều kiện khí hậu phù hợp với cây rau màu vụ hè thu trong khu vực; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validacin, Bonanza,...
Cây sắn		Phát triển thân lá	Theo thống kê tháng 9 có nhiệt độ cao nhất là 29.9 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 23.2 độ C và nhiệt độ trung bình là 26.2 độ C, nền nhiệt tương đối phù hợp cho sắn phát triển trong giai đoạn này; cần chú ý bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP liều lượng từ 14 gram/16 lít nước hoặc Osago 80WG liều lượng 10 gram/16 lít nước,...

III. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trong tháng 9 năm 2021, thông báo đã tổng hợp diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như Hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thông kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Tuần \ Yếu tố	Nhiệt độ tối cao (độ C)	Nhiệt độ tối thấp (độ C)	Nhiệt độ trung bình (độ C)	Lượng mưa (mm)
Tuần 1	30.3	25.5	27.9	195.5
Tuần 2	31.7	26.3	29.0	119.5
Tuần 3	29.9	24.9	27.4	223.4
Đặc trưng KT tháng 9	31.7	24.9	28.1	538.4

Có thể nhận thấy tháng 9 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nhiệt độ tối thấp dao động từ 24.9 đến 26.3 độ C, nhiệt độ tối cao dao động từ 29.9 đến 31.7 độ C; nhiệt độ trung bình dao động từ 27.4 đến 29.0 độ C. Lượng mưa cao nhất vào tuần 3 tháng 9 với tổng lượng mưa là 223.4mm.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ


Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà sớm	Chín - thu hoạch	Nền nhiệt độ tháng 9 giảm so với tháng 8 tuy nhiên tổng lượng mưa tháng 9 có xu thế tăng mạnh; nhiệt độ trung bình là 28.1 độ C và tổng lượng mưa khoảng 538.4mm. Cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối đen lép lửng, sâu phao; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Vixazol 275SC, Vicarben 50HP, Vivil 5SC,...
Ngô	Hè thu	Phát triển bắp	Nhiệt độ trung bình tháng 9 là 28.1 độ C, tổng lượng mưa tháng 9 là 538.4mm. Cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC...
Nhãn		Chăm sóc, phục hồi	Nền nhiệt tháng 9 có xu hướng giảm so với nền nhiệt tháng 8; nhiệt độ trung bình tháng khoảng 28.1 độ C, tương đối phù hợp giai đoạn chăm sóc và phục hồi sau thu hoạch của nhãn. Cần lưu ý bệnh thán thư, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc hoạt chất Propineb
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê cho thấy nền nhiệt tháng 9 giảm so với tháng 8; cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đọt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất
Cây rau màu		Các giai đoạn	Thống kê cho thấy nền nhiệt trung bình tháng 9 dao động từ 27.4 đến 29.0 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Azadirachtin, Emamectin Benzoate,...

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình tháng 9 giảm so với tháng 8; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm Zinkicide, có thành phần chính là nano Kẽm (ZnO)
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình tháng 9 là 28.1 độ C; cần chú ý một số bệnh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh to; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Midan 10WP, Anisaf SH-01 nồng độ 1%, Mospilan 3EC,...

IV. Khu vực Nam Bộ

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Nam Bộ trong tháng 9 năm 2021, báo cáo đã tổng hợp diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như Hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thống kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Nam Bộ được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Nam Bộ

Tuần \ Yếu tố	Nhiệt độ tối cao (độ C)	Nhiệt độ tối thấp (độ C)	Nhiệt độ TB (độ C)	Lượng mưa (mm)
Tuần 1	30.0	24.4	27.2	179.3
Tuần 2	31.2	25.2	28.2	141.6
Tuần 3	31.2	25.3	28.2	129.1
Đặc trưng KT tháng 9	31.2	24.4	27.9	450.0

Có thể nhận thấy nhiệt độ trung bình các tuần dao động từ 27.2 đến 28.2 độ C. Lượng mưa của các tuần trong tháng dao động từ 129.1 tới 179.3 mm. Trong tháng 9 nhiệt độ có xu thế hơi tăng từ đầu tháng tới cuối tháng, tổng lượng mưa của các tuần trong tháng có xu thế giảm từ đầu tháng tới cuối tháng.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Nam Bộ được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Nam Bộ

Cây trồng	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây cà phê	Phát triển thân lá, nuôi quả	Lượng mưa trong tháng 9 của khu vực đạt 450.0mm. Cây cà phê đang trong giai đoạn phát triển thân lá, nuôi quả. Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp với cây trồng, lượng mưa trên trung bình một số khu vực ít mưa cần chú ý bổ sung nước cho cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh khô cành, gỉ sắt và bọ xít muỗi.
Cây chôm chôm	Chăm sóc, phát triển thân lá	Nền nhiệt độ trung bình tháng 9 của khu vực đạt 27.9°C, điều kiện nhiệt độ của khu vực tương đối thuận lợi cho cây chôm chôm phát triển. Lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 450.0mm khá phù hợp cho giai đoạn chăm sóc và phát triển thân lá của chôm chôm. Trong tháng, một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh phấn trắng, bệnh héo đen đầu lá, bệnh nấm hồng.
Sắn	phát triển thân lá, phát triển củ, thu hoạch	Tháng 9, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 24.4-31.2°C, lượng mưa tháng 9 của khu vực đạt 450.0mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tháng của khu vực tương đối phù hợp cho sinh trưởng của cây sắn. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh thối củ, bệnh khảm lá do virus.
Dừa	đang trong các giai đoạn	Nền nhiệt độ trung bình tháng 9 của khu vực đạt 27.9°C, điều kiện nhiệt độ của khu vực tương đối thuận lợi cho cây dừa sinh trưởng và phát triển. Lượng mưa trong tháng của khu vực đạt 450.0mm khá phù hợp cho giai đoạn phát triển của cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bọ cánh cứng, bọ dừa, kiến vương, bọ xít và làm cỏ.
Cây ngô	cây con, phát triển thân lá, trổ cờ, thu	Trong tháng 9, cây ngô trong khu vực đang trong các giai đoạn cây con – phát triển thân lá - trổ cờ - thu hoạch. Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ

Cây trồng	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
	hoạch	phù hợp với cây ngô, lượng mưa trên trung bình, một số khu vực mưa ít cần chú ý bổ sung nước cho cây. Ngoài ra, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: khô vằn, sâu keo.
Cây cao su	chăm sóc, khai thác mủ	Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp với cây trồng, lượng mưa trên trung bình, một số khu vực mưa ít cần chú ý bổ sung nước cho cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: các loại kiến, bọ xít, bệnh thán thư, phấn trắng, xỉ mù thân.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)	Đang trong nhiều giai đoạn	Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp với cây trồng, lượng mưa trên trung bình, một số khu vực mưa ít cần chú ý bổ sung nước cho cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: sâu cuốn lá nhỏ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành, bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, diệt cỏ dại.
Hồ tiêu	Chăm sóc, phát triển thân lá	Nhiệt độ trung bình trong tháng 9 của khu vực đạt 27.9°C, lượng mưa tháng 9 khu vực đạt 450.0mm. Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp với sinh trưởng của cây hồ tiêu, lượng mưa trên trung bình một số khu vực cần chú ý bổ sung nước cho cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: héo chết nhanh, bệnh vàng lá thối rễ tơ, rệp sáp cành, gốc, tuyến trùng rễ.
Mía	Cây con, vươn lóng	Tháng 9, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 24.4-31.2°C, lượng mưa tháng 9 của khu vực đạt 450.0mm. Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp với cây trồng, lượng mưa trên trung bình, một số khu vực mưa ít cần chú ý bổ sung nước cho cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: sâu đục thân, bông lá và làm cỏ.
Cây xoài	Nuôi quả, thu hoạch	Trong tháng 9 cây xoài đang trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực rất phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích xoài đã chín quả bảo đảm chất lượng tốt. Các diện tích xoài đang trong giai đoạn nuôi quả cần thêm nước bổ sung. Các đối tượng sâu bệnh hại trên cây xoài cần lưu ý: các loại kiến, bọ xít, bệnh thán thư, phấn trắng, xỉ mù thân.
Mít	Nuôi quả - thu hoạch	Tháng 9, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 24.4-31.2°C, lượng mưa tháng


Cây trồng	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
		9 của khu vực đạt 450.0mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích mít đã chín quả. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: các loại sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, sâu đục trái, rệp sáp.
Sầu riêng	Nuôi quả, thu hoạch	Tháng 9, cây sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi quả, thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực khá thuận lợi cho cây sầu riêng thu hoạch các diện tích sầu riêng đã chín quả. Các diện tích đang trong giai đoạn nuôi quả, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sầu riêng. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây sầu riêng trong tháng: Rầy phấn; nhện đỏ, rầy lửa; sâu đục thân, đục cành; các bệnh do nấm <i>Phytophthora palmivora</i> gây nên.
Cây thanh long	Nuôi quả - thu hoạch	Nhiệt độ trung bình trong tháng 9 của khu vực đạt 27.9°C, lượng mưa tháng 9 khu vực đạt 450.0mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích thanh long đã chín quả. Các đối tượng sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: các loại kiến, bọ xít, ruồi vàng hoặc hiện tượng nứt vỏ trái.
Lúa (Hè - thu)	thu hoạch	Nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp với giai đoạn thu hoạch lúa. Trong giai đoạn lúa thu hoạch cần lưu ý đến chuột hại.
Lúa (thu đông - mùa)	Mạ, đẻ nhánh, đòng, trổ, chín	Tháng 9, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 24.4-31.2°C, lượng mưa tháng 9 của khu vực đạt 450.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tháng của khu vực tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, tuy nhiên lượng mưa trong tháng khá thấp. Do đó, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa (đặc biệt là các diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trổ). Trong tháng, một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính trên cây lúa là: bệnh đạo ôn lá, rầy hại lúa, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, Sâu đục thân, giai đoạn lúa chín cần lưu ý đến chuột hại.
Cây rau màu	Các giai đoạn khác nhau	Nền nhiệt độ trung bình tháng 9 của khu vực đạt 27.9°C, điều kiện nhiệt độ của khu vực tương đối thuận lợi cho cây rau màu phát triển. Lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 450.0mm khá phù hợp cho giai đoạn chăm sóc và phát triển của cây trồng. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp

Cây trồng	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
		trong các giai đoạn phát triển này: các loại sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển.
Điều	phát triển thân lá, sau thu hoạch	Nhiệt độ trung bình trong tháng 9 của khu vực đạt 27.9°C, lượng mưa tháng 9 khu vực đạt 450.0mm. Nền nhiệt tháng 9 khu vực Nam Bộ phù hợp cho cây điều sinh trưởng và phát triển, lượng mưa trên trung bình một số khu vực cần chú ý bổ sung nước cho cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, sâu đục rệp lá,...

V. Khu vực Nam Trung Bộ

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Nam Trung Bộ trong tháng 9 năm 2021, báo cáo đã tổng hợp diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thông kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Nam Trung Bộ được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Nam Trung Bộ

THÁNG 9	Nhiệt độ tối cao	Nhiệt độ tối thấp	Nhiệt độ trung bình	Lượng mưa
Tuần 1	31.1	25.8	28.5	150.8
Tuần 2	30.3	25.8	28.1	137.3
Tuần 3	30.0	25.1	27.5	98.9
Đặc trưng KT tháng 9	31.1	25.1	28.0	387.0

Có thể nhận thấy nhiệt độ trong tháng dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm. Lượng mưa trong tháng cao nhất tại tuần đầu và giảm ở những tuần tiếp theo của tháng.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Nam Trung Bộ được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Nam Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Trà	Giai đoạn sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè Thu	Sớm	Thu hoạch xong	<p>Nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là điều kiện thuận lợi cho lúa ở các giai đoạn này. Trong tháng, Sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đòng trở - chín, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình;</p> <p>- Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng ở Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ lúa trở - chín;</p> <p>- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ... gây hại nhẹ - trung bình trên lúa vụ 3, lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đòng;</p> <p>- Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa (Hè Thu, lúa Mùa, lúa vụ 3);</p> <p>- Ốc bươu vàng: Gây hại rải rác trên lúa vụ 3, vụ Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.</p>
		Chính vụ	Chắc xanh - chín - thu hoạch	
		Muộn	Đứng cái - chắc xanh - thu hoạch	
	Vụ 3, Mùa		Mạ - đẻ nhánh - đòng	
Ngô	HT 2021		Thâm râu - thu hoạch	<p>Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là điều kiện thuận lợi cho ngô ở các giai đoạn này. Trong tháng, sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại trên ngô Hè Thu, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... hại cục bộ.</p>
	Mùa 2021		Cây con - PTTL	

Cây trồng	Mùa vụ	Trà	Giai đoạn sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Sắn	Đông xuân		Nuôi củ - thu hoạch	Trong tháng, nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là điều kiện thích hợp cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh hoặc những vùng mới xuống giống. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại như: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.
	Hè thu		Cây con – phát triển thân lá	
Rau màu			Các giai đoạn	Các đối tượng sinh vật hại như xoắn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, ... phát sinh gây hại tăng trên tại rau họ hoa thập tự, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Trên hành hoa chú ý sâu xanh da láng tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại
Mía			Đẻ nhánh – vươn lóng	Từ bảng 1 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là điều kiện thuận lợi cho cây mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Lưu ý, Bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, mía trồng mới không sạch bệnh.
Thanh long			Chăm sóc - thu hoạch	Nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là điều kiện thuận lợi cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển. Bệnh đốm nâu, thán thư, ... phát sinh và gây hại tăng do điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, có mưa nhiều.


Cây trồng	Mùa vụ	Trà	Giai đoạn sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Sầu riêng			Nuôi quả – thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển. Trong tháng các bệnh như: bệnh loét, bệnh sẹo, chảy gôm,... gây hại tại các vùng chuyên canh, chăm sóc kém.
Hồ tiêu			Quả non – nuôi quả	Nhiệt độ dao động từ 25.1 độ C đến 31.1 độ C, nhiệt độ trung bình tháng là 28.0 độ C và tổng lượng mưa là 387.0mm là điều kiện thuận lợi cho cây hồ tiêu sinh trưởng, phát triển. Trong tháng bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng tại các vườn kém chăm sóc, hại nặng cục bộ; Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc+ cành...hại chủ yếu ở giai đoạn quả non – chắc quả.

VI. Khu vực Tây Bắc

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu thực đo từ các trạm khí tượng thuộc khu vực Tây Bắc trong tháng 9 năm 2021, diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực được khái quát như hình dưới đây:

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021



Thống kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Tây Bắc được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Tây Bắc

THÁNG 9	Nhiệt độ tối cao	Nhiệt độ tối thấp	Nhiệt độ trung bình	Lượng mưa
Tuần 1	29.2	22.0	25.6	98.4
Tuần 2	30.8	21.7	26.2	61.2
Tuần 3	28.8	21.3	25.1	91.4
Đặc trưng KT tháng	30.8	21.3	25.6	251.0

Có thể nhận thấy, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc trong tháng 9 dao động trong khoảng 21.3-30.8°C, nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 9 của khu vực đạt 25.6°C, lượng mưa trong tháng của khu vực đạt 251.0mm với lượng mưa tập trung chủ yếu vào tuần 1 và tuần 3 tháng 9.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Tây Bắc được khái quát trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Tây Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo. lưu ý
Cây lúa	Mùa	Đứng cái – làm đòng - trổ - chín – thu hoạch	Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực dao động trong khoảng 21.3-30.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 251.0mm. Tuần 2 tháng 9, khu vực Tây Bắc có lượng mưa đạt 61.2mm, lượng mưa không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa nên người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung. Sâu bệnh hại cây lúa trong tháng chủ yếu là các đối tượng: Sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng cục bộ trên các diện tích lúa Mùa muộn, rầy nâu/rầy lưng trắng gây hại gia tăng trên các trà lúa nhất là các trà lúa trong giai đoạn trổ - chắc xanh.
Cây ngô	Hè Thu	Xoáy nõn - trổ cờ - phát triển bắp – thu hoạch	Tháng 9, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa cơ bản khá phù hợp cho cây ngô Hè thu phát triển. Sâu bệnh gây hại trên cây ngô Hè thu chủ yếu: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân/bắp, rệp hại cờ...
	Đông	Mới trồng, 1-3 lá	Cây ngô Đông trong tháng 9 ở trong giai đoạn mới trồng – 3 lá. Thời tiết tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp cho cây ngô Đông phát triển. Lưu ý đối tượng: Sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, bệnh đốm lá...gây hại trên cây ngô.


Cây sắn		Phát triển thân lá	Tháng 9, cây sắn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá. Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp cho cây sắn phát triển. Tuy nhiên, tuần 2 tháng 9 khu vực Tây Bắc có lượng mưa tương đối thấp do đó cần phải tưới bổ sung thêm nước cho cây sắn. Sâu bệnh hại trong tháng 9 chủ yếu là đối tượng bệnh khảm lá virus, bọ phấn trắng...
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Cây ăn quả có múi trong tháng 9 tiếp tục giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Tháng 9, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tương đối phù hợp cho cây ăn quả có múi phát triển. Các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi: gài trích hút, sâu đục trái, rầy chổng cánh, rệp sáp, bệnh loét,...
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Nền nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Tuần 2 tháng 9, khu vực Tây Bắc đạt 61.2mm, do đó cần tưới thêm nước bổ sung cho cây chè phát triển tốt. Trong tháng 9, các đối tượng sâu bệnh hại trên cây chè chủ yếu: bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi....
Cây vải		Phát triển lộc	Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực dao động trong khoảng 21.3-30.8°C. Điều kiện nhiệt độ khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Tuy nhiên, lượng mưa trong tháng của khu vực...nhất là tuần 2 tháng 9 với lượng mưa tuần chỉ đạt 61.2mm. Cây vải đang trong giai đoạn phát triển lộc, việc bổ sung nước và phân bón cho cây vải là rất cần thiết để cây vải tập trung ra lộc đúng thời điểm, bảo đảm cho việc ra hoa và quả vụ sau thuận lợi. Do đó, để bảo đảm cho cây vải phát triển tốt, người dân cần chủ động tưới thêm nước cho cây vải. Sâu bệnh hại trên cây vải chủ yếu là: sâu non ăn lá, sâu ăn gân lá, sâu đục thân...
Cây nhãn		Thu hoạch – chăm sóc	Cây nhãn trong tháng 9 tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch, một số diện tích đã thu hoạch xong chuyển sang giai

			đoạn chăm sóc sang thu hoạch. Nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực tương đối thuận lợi cho quả nhãn chín. Sâu bệnh hại cây trong tháng không đáng kể, chủ yếu là đối tượng sâu đục thân.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Khu vực Tây Nguyên

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Tây Nguyên trong tháng 9 năm 2021, báo cáo đã tổng hợp diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thống kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Tây Nguyên được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Tây Nguyên

THÁNG 9	Nhiệt độ tối cao	Nhiệt độ tối thấp	Nhiệt độ trung bình	Lượng mưa
Tuần 1	27.6	20.6	24.1	195.5
Tuần 2	26.8	20.5	23.7	138.7
Tuần 3	26.9	19.8	23.3	120.0
Đặc trưng KT tháng 9	27.6	19.8	23.7	454.2

Có thể nhận thấy nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm. Lượng mưa cao nhất ở tuần đầu tiên và giảm đến cuối tháng.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Tây Nguyên được thống kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Tây Nguyên

Cây trồng	Mùa vụ	Trà	Giai đoạn sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Hè Thu	Sớm	Chín – thu hoạch	<p>Nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong tháng, sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục gây hại lúa Hè Thu muộn giai đoạn trổ - chín, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng ở Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ; - Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm,.. phát sinh gây hại trên lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng - Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa (Hè Thu cuối vụ, lúa Mùa); - Ốc bươu vàng: Tiếp tục gây hại chủ yếu trên lúa Mùa giai đoạn từ Mạ - đẻ nhánh
		Chính vụ	Chắc xanh – chín – thu hoạch	
		Muộn	Đứng cái – chắc xanh - chín	
	Vụ mùa (Lâm Đồng)		Mạ - đẻ nhánh – đòng trổ	
Cây ngô	Hè Thu 2021		Thâm râu – thu hoạch	<p>Tổng hợp ở bảng 1 cho thấy, nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm là điều kiện thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Lưu ý, sâu keo mùa thu... tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại</p>


	Mùa 2021		Cây con – Phát triển thân lá	tăng trên ngô mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác như sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,... hại cục bộ.
Cây sắn	ĐX 2020 - 2021		Tích lũy tinh bột	Theo thống kê trong tháng, nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm là điều kiện thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Lưu ý, Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh, nhất là những vùng mới xuống giống. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại như: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch.
	HT 2021		Cây con - PTTL	
Rau màu			Trong các giai đoạn sinh trưởng	Các đối tượng sinh vật hại như xoắn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rế, thối nhũn, ... phát sinh gây hại tăng trên tại rau họ hoa thập tự tại các tỉnh Tây Nguyên, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Trên hành hoa chú ý sâu xanh da láng tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại.
Hồ Tiêu			Quả non, nuôi quả	Nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm là điều kiện thuận lợi cho hồ tiêu. Lưu ý, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ, rệp các loại... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn quả non – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm

				sóc kém..
Điều			Chăm sóc – ra đọt non	Từ bảng 1 cho thấy, nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm là điều kiện thuận lợi cho cây điều sinh trưởng và phát triển. Lưu ý: Bọ xít muỗi, bọ trĩ, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư... tiếp tục phát sinh gây hại tăng trong điều kiện thời tiết thuận lợi thời gian tới, hại nặng cục bộ.
Sầu riêng			Nuôi quả – thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm là điều kiện thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển. Lưu ý bệnh xì mù có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm ở những vườn chăm sóc kém.
Cà Phê			Nuôi quả - chắc quả – thu hoạch	Điều kiện khí tượng trong tháng ở ngưỡng thuận lợi cho cà phê sinh trưởng và phát triển khi nhiệt độ tháng 9 dao động từ 19.8 đến 27.6 độ C, nhiệt độ trung bình tháng 23.7 độ C, tổng lượng mưa tháng 454.2mm. Lưu ý bọ xít muỗi tiếp tục gây hại tăng trên cà phê; Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, mọt đục cành...tiếp tục gây hại trên cà phê giai đoạn nuôi quả - chắc quả.

VIII. Khu vực Trung Trung Bộ

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Trung Trung Bộ trong tháng 9 năm 2021, khái quát diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thông kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Trung Trung Bộ được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021
khu vực Trung Trung Bộ

THÁNG 9	Nhiệt độ tối cao	Nhiệt độ tối thấp	Nhiệt độ trung bình	Lượng mưa
Tuần 1	30.9	24.4	27.7	224.7
Tuần 2	29.2	24.2	26.7	345.5
Tuần 3	30.1	25.4	27.7	152.5
Đặc trưng KT tháng	30.9	24.2	27.4	722.7

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Trung Trung Bộ được khái quát trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Trung Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Hè thu	Trỗ - phơi màu - ngâm sủ - chín - thu hoạch xong.	Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực dao động trong khoảng 24.2-30.9°C, điều kiện nhiệt độ của khu vực tương đối phù hợp cho cây lúa phát triển. Lượng mưa trong tháng 9 của khu vực rất cao do ảnh hưởng của bão Conson (đặc biệt


			là tuần 1 và tuần 2 tháng 9). Do lượng mưa trong tháng của khu vực rất cao khiến cho nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do mưa bão. Sâu bệnh hại cây lúa trong tháng đã giảm do lúa chín đã thu hoạch, sâu bệnh gây hại cục bộ trên các diện tích lúa đang trổ - chín chưa thu hoạch: bệnh lem lép hạt, rầy nâu, bệnh khô vằn, đốm nâu...
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp – thâm râu – thu hoạch.	Tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa trong tháng 9 của khu vực tương đối cao lớn, đặc biệt là tuần 1 và tuần 2 tháng 9. Do lượng mưa trong tháng của khu vực tương đối cao khiến cho một số diện tích ngô bị thiệt hại do mưa bão, nhiều diện tích ngô bị ngập gây ảnh hưởng xấu tới sinh trưởng và phát triển của cây ngô. Trong tháng, các đối tượng sâu bệnh hại trên cây ngô chủ yếu: sâu keo mùa thu, sâu đục thân/bắp...
Cây lạc	Hè thu	Phát triển củ - thu hoạch	Trong tháng 9, cây lạc Hè thu tiếp tục giai đoạn phát triển củ, nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Nhiệt độ tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp cho cây lạc phát triển, tuy nhiên do lượng mưa trong tháng tương đối cao khiến cho một số diện tích lạc bị thiệt hại. Sâu bệnh hại trên cây lạc trong tháng: bệnh đốm lá lạc, bệnh héo rũ...
Cây sắn	Đông xuân 2020-2021	Phát triển củ - thu hoạch	Cây sắn Đông xuân tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp cho cây sắn phát triển. Tuy nhiên, trong tháng 9 do lượng mưa của khu vực rất cao, do đó nhiều diện tích sắn đã bị thiệt hại do mưa bão. Bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn.
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp cho cây ăn quả có múi phát triển. Tuy nhiên, trong tháng 9, do lượng mưa của khu vực khá lớn khiến cho nhiều diện tích cây ăn quả có múi bị úng nước quanh gốc gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển

			của cây. Đối tượng gây hại chính trên cây sắn trong tháng là bệnh khảm lá virus, người dân cần theo dõi và phát hiện các diện tích bị nhiễm bệnh để nhánh chổng thu gom và tiêu hủy kịp thời tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng.
Cây cao su		Khai thác mủ	Trong tháng 9, cây cao su tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Nhiệt độ tháng 9 của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây cao su. Tuy nhiên, lượng mưa trong tháng khá lớn gây ảnh hưởng không tốt tới sinh trưởng của cây cao su. Các đối tượng sâu bệnh hại trên cây cao su trong tháng: bệnh thán thư, rệp lá <i>Corynespora</i> , rệp lá <i>Pestalotiopsis</i> , loét sọc miệng cạo, xì mủ, nấm hồng...
Cây tiêu		Chăm sóc – ra đọt non	Cây hồ tiêu trong tháng 9 đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch – ra đọt non. Tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão với lượng mưa đạt 722.7mm đã khiến cho nhiều diện tích tiêu bị úng nước quanh gốc, gây ảnh hưởng xấu tới sinh trưởng và phát triển của cây tiêu. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây tiêu trong tuần chủ yếu: bệnh chết nhanh/chết chậm, bệnh thán thư, bệnh đốm rong...

IX. Khu vực Việt Bắc

1. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Với số liệu khí tượng từ các trạm thuộc khu vực Việt Bắc trong tháng 9 năm 2021, khái quát diễn biến tổng lượng mưa và nhiệt độ tháng 9 của khu vực như hình dưới đây:



Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và mưa tháng 9 năm 2021

Thông kê các đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 khu vực Việt Bắc được thể hiện trong Bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng và lượng mưa tháng 9 năm 2021 khu vực Việt Bắc

THÁNG 9	Nhiệt độ tối cao	Nhiệt độ tối thấp	Nhiệt độ trung bình	Lượng mưa
Tuần 1	28.0	21.6	24.8	106.3
Tuần 2	28.6	22.1	25.4	75.2
Tuần 3	26.6	20.5	23.5	110.3
Đặc trưng KT tháng	28.6	20.5	24.6	291.8

Từ bảng 1, có thể nhận thấy: nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc trong tháng 9 dao động trong khoảng 20.5-28.6°C, lượng mưa tháng của khu vực đạt 291.8mm.

2. Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021

Tổng hợp đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Việt Bắc được khái quát trong bảng dưới đây:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp tháng 9 năm 2021 khu vực Việt Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Mùa	Đứng cái – làm đòng - trổ - chín – thu hoạch	Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực Việt Bắc dao động trong khoảng 20.5-28.6°C, lượng mưa tháng 9 của khu vực đạt 291.8mm. Tuần 2 tháng 9, khu vực Việt Bắc có lượng mưa đạt 75.2mm, lượng mưa không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa do đó cần phải được tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm cây lúa phát triển tốt nhất. Sâu bệnh hại cây lúa trong tháng chủ yếu là các đối tượng: sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột...
Cây ngô	Hè Thu	Xoáy nõn - trổ cờ - phát triển bắp – thu hoạch	Tháng 9, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tương đối phù hợp cho cây ngô Hè thu sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô Hè thu trong tháng chủ yếu: sâu keo mùa thu, sâu đục thân/bắp...
	Đông	Mới trồng, 1-3 lá	Cây ngô đông trong tháng 9 đang trong giai đoạn mới trồng, 1-3 lá. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần 1 và tuần 2 tháng 9 của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Tuần 3 tháng 9, do nền nhiệt độ của khu vực giảm khiến cho sinh trưởng của cây

			ngô bị chậm lại. Sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây ngô đông: Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu ăn lá...
Cây lạc	Đông	Gieo – cây con	Nhiệt độ tuần 3 tháng 9 của khu vực ở mức thấp, dao động trong khoảng 20.5-26.6°C. Do điều kiện nhiệt độ trong khu vực ở mức thấp khiến cho cây lạc sinh trưởng chậm (nhất là quá trình nảy mầm diễn ra ở hạt lạc). Sâu bệnh gây hại trên cây lạc chủ yếu: Sâu ăn lá, sâu xám, bệnh héo rũ...
Cây sắn		Phát triển thân lá	Nền nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực cơ bản khá thích hợp sinh trưởng của cây sắn. Bệnh khảm lá sắn tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tháng 9. Người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh, chủ động thu gom và tiêu hủy những diện tích bị nhiễm bệnh để tránh bệnh lây lan trên diện rộng.
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Trong tháng 9, cây ăn quả có múi tiếp tục giai đoạn phát triển quả, nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích cây ăn quả có múi đã chín. Các đối tượng sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi chủ yếu: Sâu đục trái, ngài trích hút, bệnh loét sẹo...
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Nền nhiệt độ tháng 9 của khu vực Việt Bắc dao động trong khoảng 20.5-28.6°C, lượng mưa trong tháng của khu vực đạt 291.8mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tháng 9 của khu vực khá phù hợp cho cây chè phát triển. Sâu bệnh hại cây chè trong tháng chủ yếu: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh...
Cây vải		Phát triển lộc	Trong tháng 9, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trong khoảng 20.5-28.6°C; lượng mưa tháng 9 của khu vực 291.8mm. Cây vải trong tháng tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc thu. Để bảo đảm cây vải ra lộc đúng thời điểm. Người dân tưới nước và bón phân cân đối cho cây vải. Đặc biệt cần quan tâm đối tượng sâu ăn lá non, ngoài ra còn có đối tượng sâu đục thân, sâu ăn gân

			lá...khi thấy các đối tượng này phát triển quá mức cho phép cần nhanh chóng phun thuốc để diệt trừ tránh cho các đối tượng này gây hại cho cây vải.
Cây nhãn		Thu hoạch – chăm sóc	Nhiệt độ và lượng mưa tháng 9 của khu vực khá thuận lợi cho cây nhãn chín quả bảo đảm chất lượng. Sâu bệnh hại trên cây nhãn trong tuần không đáng kể, chủ yếu là đối tượng sâu đục thân. Sâu khi thu hoạch người dân cần nhanh chóng tia bỏ những cành tăm, cành la trong tán vừa giúp tán cây thông thoáng vừa giúp hạn chế sâu bệnh hại cho cây.

Trong tháng 9 điều kiện khí tượng nông nghiệp ở hầu hết các vùng trong cả nước không thực sự thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Lượng mưa lớn, số ngày mưa nhiều, phân bố đều trong tháng, kết hợp với nền nhiệt và số giờ nắng khá, gió tây khô nóng giảm hẳn so với các tháng trước tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên cuối tháng 9 năm 2021 đã xảy ra mưa lớn trên các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, mưa lớn liên tục nhiều ngày đã làm ngập úng diện rộng, gây thiệt hại không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp; nhiều diện tích lúa và hoa màu đã ngập trắng. Thiệt hại do thiên tai trong tháng 9 chủ yếu do ảnh hưởng của bão, lũ, mưa lớn, lốc xoáy và sạt lở. Một số sâu bệnh phát triển trong tháng 9 như: dòi đục thân, bệnh thối rễ, sâu đục trái, bọ xít lười...

NGƯỜI THỰC HIỆN

Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng