



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 19.4 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 84.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 19mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 28 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 15.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 20-24/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25-26/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét. Từ ngày 27-30/12, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.1	19.8	22.0	103.2
Trong tuần	22.6	19.4	21.0	84.2
Tuần tới	24-27	15-18	19.5-22.5	50-150

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: Trung Bộ đã được cày lật đất, một số diện tích gieo cấy sớm đang trong giai đoạn mạ (mũi chông – 3 lá). Trong giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển từ $25-30^{\circ}\text{C}$. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm (trung bình giảm 1.0°C so với tuần trước), lượng mưa trong tuần của khu vực cùng chung xu thế giảm với nhiệt độ (lượng mưa tuần này của khu vực giảm 19.0mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp cho công tác chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây mạ trong tuần: ốc brou vàng, chuột, dòi đục nõn, rầy các loại... Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng $15.0-27.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 50-150mm. Cần lưu ý: tiếp tục chuẩn bị đất và vật tư (giống, phân bón...), tu bổ đê điều, nạo vét kênh mương... để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022 đúng lịch thời vụ.

Cây ngô: tiếp tục trong giai đoạn trở cò - phun râu – chín sữa – thu hoạch. Tuần 2 tháng 12, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng $19.4-22.6^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 84.2mm. Điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô trong giai đoạn chín sữa – thu hoạch. Tuy nhiên với các giai đoạn trở cò - phun râu, với lượng mưa trong tuần ở mức

trung bình cần phải chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây ngô trong giai đoạn này. Sâu keo mùa thu tiếp tục là đối tượng sâu bệnh hại trên cây ngô trong tuần, ngoài ra còn một số đối tượng: bệnh đốm lá, vàng lá... Dự báo, tuần 3 tháng 12 thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục phù hợp cho cây ngô sinh trưởng, người dân cần tiếp tục các biện pháp chăm sóc giúp cây ngô sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao.

Cây lạc vụ mùa: tiếp tục trong giai đoạn ra hoa - tạo quả. Cây lạc sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 23-33°C. Tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 21.0°C khiến số hoa nở trên cây lạc có sự sụt giảm, người dân chú ý bảo đảm bón phân đầy đủ giúp cho cây lạc sinh trưởng khỏe mạnh. Sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: bệnh thối góc lở cổ rễ, sâu khoang, sâu xanh... người dân cần chú ý theo dõi và có các biện pháp phòng trừ phù hợp để tránh sâu bệnh phát sinh gây hại nặng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lạc. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 19.5-22.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 50-150mm. Trong quá trình chăm sóc, tiếp tục lưu ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc để kịp thời phòng trừ.

Cây sắn (niên vụ 2021): tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, thời tiết trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây sắn. Trong tuần, cây sắn tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá do virus, bệnh đốm lá, bệnh thối củ. Người dân cần tiếp tục thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm; đối với các diện tích sắn nhiễm bệnh, sau khi thu hoạch cần tiến hành tiêu hủy các bộ phận bị bệnh để hạn chế nguồn bệnh tồn tại và phát triển trên đồng ruộng. Đồng thời, cần tiếp tục bảo vệ các diện tích sắn giữ lại làm giống, chuẩn bị nguồn giống sạch cho niên vụ năm 2022. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực tiếp tục phù hợp với sinh trưởng của cây sắn, người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh khảm lá do virus trên cây sắn.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh, bưởi): đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Trong tuần, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 21.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 84.2mm. Cây ăn quả có múi đang trong giai đoạn thu hoạch, các diện tích đã thu hoạch xong chuyển sang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Cần lưu ý: vệ sinh vườn, cắt tỉa các cành sâu bệnh, chống đỡ các cành gần mặt đất, vun gốc; tăng cường chăm, bón phân cân đối và hợp lý cho cây sau thu hoạch quả để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, chống chịu sâu bệnh hại. Sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân/cành, bệnh chảy gôm, bệnh vàng lá sinh lý... Dự báo, tuần sau thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong thời gian tới, bên cạnh việc thu hoạch các diện tích quả còn lại, người dân cần tiếp tục các biện pháp để chăm sóc giúp cây nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch.

Cây cao su: tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Nhiệt độ tối thích cho cây cao su từ 26-28°C. Tuần 2 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất của khu vực đạt 19.4°C, nhiệt độ cao nhất của khu vực đạt 22.6°C, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 21.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 84.2mm. Trong tuần, do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp khiến cho cây cao su sinh trưởng chậm cũng như gây ảnh hưởng đến quá trình chảy mủ khi khai thác cao su. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây cao su trong tuần: bệnh rụng lá

đốm tròn, bệnh thán thư, bệnh loét sọc miệng cao, xì mũ, nấm hồng...Tuần 3 tháng 12, nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 19.5-22.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 50-150mm, cần tiếp tục lưu ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây cao su để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây hồ tiêu: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng từ 25-27°C. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, cụ thể: nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 21.0°C, giảm 1.0°C so với tuần trước; lượng mưa tuần này của khu vực đạt 84.2mm, giảm 19.0mm so với tuần trước. Cây hồ tiêu tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch, thời tiết trong tuần này cơ bản phù hợp với cây tiêu trong giai đoạn này. Chú ý, đối với các diện tích tiêu đã thu hoạch xong, cần tiến hành rửa cây bằng thuốc nhằm tiêu diệt hết mầm bệnh còn sót lại trên cây/lá và làm cho những lá già/lá bệnh rụng đi; đồng thời cần làm sạch chòi, cắt bỏ tiêu lươn, tay sát đất, thu gom lá rụng quanh gốc và các lá già, lá bệnh đem đốt bỏ. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa dự báo của khu vực cơ bản tiếp tục phù hợp với sinh trưởng của cây hồ tiêu. Trong quá trình chăm sóc cần tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh gây hại trên cây hồ tiêu.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.0 – 27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.5-22.5°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 50 – 150mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền cơ bản phù hợp với sinh trưởng của các loại cây trồng. Trong tuần tới, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng