



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 18.9 – 23.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0°C, tổng lượng mưa là 194.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 110.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 61.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 154.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 03-08/01, có mưa vài nơi; riêng ngày 03/01 phía Bắc ngày có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 09-11/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.6	19.4	21.0	84.2
Trong tuần	23.1	18.9	21.0	194.5
Tuần tới	28-31	19-21	23.5-26.0	30-50

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: tiếp tục trong giai đoạn chuẩn bị đất gieo trồng cho vụ mới, một số ít diện tích gieo cấy sớm đang trong giai đoạn mạ 4-5 lá. Nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển từ $25-30^{\circ}\text{C}$. Trong tuần, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng $18.9-23.1^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 194.5mm. Có thể nhận thấy, trong tuần khu vực có nền nhiệt độ thấp không thực sự thuận lợi cho cây mạ phát triển. Sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần chủ yếu là các đối tượng: ốc bươu vàng, chuột... gây hại trên các diện tích mạ gieo cấy sớm. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng $19.0-31.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 30-50mm. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý các đối tượng ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh gây hại (cần tổ chức tiêu diệt chuột; thu gom trứng, ốc bươu vàng tiêu hủy nhằm hạn chế tích lũy mật độ trên đồng ruộng); ngoài ra cần chú ý các đối tượng dòi đục nõn, rầy có khả năng phát sinh gây hại trong thời gian tới.

Cây ngô: tiếp tục trong giai đoạn trỗ cờ - phun râu - thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực không thay đổi so với tuần trước; lượng mưa tuần này của khu vực tăng mạnh so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 194.5mm tăng

110.3mm so với tuần trước. Lượng mưa trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô, tuy nhiên, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ, việc gặp mưa to sẽ khiến cho các hạt phấn bị trôi gây ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thụ phấn (ảnh hưởng đến số lượng hạt ngô sau này). Trong tuần, cây ngô tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh hại: sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, vàng lá... Dự báo, tuần 3 tháng 12, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm. Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hại, cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ngô.

Cây lạc vụ mùa: chuyển sang giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng của cây lạc từ 23-33°C. Tuần 3 tháng 12, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 21.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 194.5mm. Điều kiện thời tiết trong tuần không thực sự thuận lợi với sinh trưởng của cây lạc. Sâu khoang, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ đạo trên cây lạc trong tuần. Tuần 1 tháng 1 năm 2022, dự báo nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 23.5-26.0°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 30-50mm. Cần chú ý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch các diện tích lạc đã đạt thành phẩm.

Cây sắn (niên vụ 2021): tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ dao động từ 18.9-23.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 194.5mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây sắn. Trong tuần, cây sắn tiếp tục chịu tác động chủ yếu bởi đối tượng bệnh khảm lá sắn do virus, người dân cần tiếp tục thu gom và tiêu hủy những cây bị nhiễm bệnh để bảo đảm cho bệnh không lây lan diện rộng cũng như bảo đảm chọn lọc và giữ lại được nguồn sắn giống khỏe mạnh cho vụ sau. Tuần tiếp theo, dự báo lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh người dân cần tranh thủ thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm để tránh ảnh hưởng do mưa gây ra.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh, bưởi): đang trong giai đoạn thu hoạch, các diện tích đã thu hoạch xong chuyển sang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này nền nhiệt độ trung bình của khu vực không thay đổi so với tuần trước, trong khi đó lượng mưa tuần này của khu vực tăng mạnh. Có thể nhận thấy, thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng. Cần lưu ý, tiếp tục thu hoạch các diện tích cây ăn quả còn lại; các diện tích đã thu hoạch xong cần chú ý: cắt tỉa cành và vệ sinh lại vườn cây, ngoài ra cần tăng cường chăm sóc và bón phân cân đối - hợp lý cho cây sau thu hoạch để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh sau một mùa thu hoạch quả đồng thời tăng khả năng chống chịu đối với sâu bệnh hại. Sâu đục thân/cành, bệnh cháy gôm, bệnh vàng lá sinh lý... tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần. Dự báo, tuần tiếp theo, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 19.0-31.0°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 30-50mm. Chú ý, tiếp tục thu hoạch các diện tích quả còn lại để chuyển sang giai đoạn chăm sóc cây sau thu hoạch.

Cây cao su: tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Nhiệt độ tối thích cho cây cao su từ 26-28°C. Trong 3 tháng 12, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 21.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 194.5mm. Trong tuần, do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp khiến cho cây cao su sinh trưởng chậm cũng như gây ảnh hưởng đến quá trình

chảy mủ khi khai thác cao su. Trong tuần, cây cao su tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cao... Dự báo, tuần 1 tháng 1 năm 2022, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 30-50mm. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh thán thư, bệnh rụng lá *Corynespora*, loét sọc miệng cao, xì mủ, nấm hồng... để có các biện pháp phòng trừ kịp thời hạn chế lây lan; ngoài ra, cần chú ý tưới bổ sung cho cây cao su để bảo đảm nhu cầu về nước của cây.

Cây hồ tiêu: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Cây hồ tiêu sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 25-27°C. Tuần này, nhiệt độ thấp nhất của khu vực đạt 18.9°C, nhiệt độ cao nhất của khu vực đạt 23.1 °C nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 21.0 °C, lượng mưa của khu vực đạt 194.5mm. Điều kiện nhiệt độ trong tuần thấp, cây hồ tiêu sinh trưởng kém. Lưu ý, tiếp tục rửa cây bằng thuốc nhằm tiêu diệt hết mầm bệnh còn sót lại trên cây/lá và làm cho những lá già/lá bệnh rụng đi; đồng thời cần làm sạch chồi, cắt bỏ tiêu lươn, tay sát đất, thu gom lá rụng quanh gốc và các lá già, lá bệnh đem đốt bỏ đối với các diện tích tiêu đã thu hoạch xong, các diện tích còn lại cần tiếp tục thu hoạch để chuyển sang công tác chăm sóc cho cây tiêu sau thu hoạch. Tuần tới, dự báo nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 23.5-26.0°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 30-50mm. Trong quá trình chăm sóc cần lưu ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây tiêu.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 19-31°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.5-26.0°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 30-50mm. Do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng