



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 5 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 25.9 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 58.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 19.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 28.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-24/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trong ngày 22/5 và 23/5; ngày 24/5 có nơi nắng nóng. Từ ngày 25-27/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 27/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 28-31/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ ngày 29-31/5 vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.4	23.9	28.1	59.7
Trong tuần	34.7	25.9	30.3	58.2
Tuần tới	35.0 - 39.0	25.0-28.0	30.0-33.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: chính vụ đang trong giai đoạn chín sấp và thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của lúa là từ $25 - 33^{\circ}$ C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ $25.9 - 34.7^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3° C, tổng lượng mưa là 58.2mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh khô vằn, bọ xít dài; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng các loại thuốc như: Ofatox 400EC, Actara 25WP, Bassa, Mipen, Nitox, Midan... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu.

Mía: tiếp tục giai đoạn đẻ nhánh với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là $20-25^{\circ}$ C, nhiệt độ tuần 2 tháng 5 dao động từ $25.9 - 34.7^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3° C, tổng lượng mưa là 58.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh thối đọt, sâu bôn vạch; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Carbosulfan (min 93%), Cartap (min 97%), Chlorantraniliprole... Số liệu dự báo tuần

sau cho thấy nhiệt độ dự báo trung bình dao động từ 30.0- 33.5°C, lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Thống kê số liệu khí tượng tuần 2 tháng 5 khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.9 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 58.2mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm (lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0 - 40.0mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng.

Sắn: diện tích sắn trong khu vực tiếp tục giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, thống kê số liệu khí tượng cho thấy nền nhiệt trong tuần dao động từ 25.9 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 58.2mm. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau có xu hướng tăng (nhiệt độ tối cao dao động trong khoảng 35.0 - 39.0°C) và lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp.

Ngô: trong giai đoạn thu hoạch, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.9 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 58.2mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số thuốc như: Bayleton 25WP (0,4 – 0,5 kg/ha), Score 250ND (0,3 – 0,5 l/ha)... Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cà chua, mồng tơi, mướp... Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.9 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 58.2mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ dự báo trung bình trong khoảng 30.0-33.5°C), lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn phát triển quả. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.9 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 58.2mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm

đen, bọ xít xanh. Nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-39.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, và lượng mưa giảm khoảng 20mm, có thể sử dụng một số biện pháp chống nóng cho cây trồng như: làm giàn che, lưới che chống nắng nóng, trồng cây dây leo làm bóng mát chống nắng cho rau; lắp đặt hệ thống tưới bằng béc hoặc nhỏ giọt cho cây trồng, tưới hàng ngày hoặc 2 ngày tưới một lần đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng