



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 19 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 38.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 34.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-04/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 02/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 04-05/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 06-07/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng sáng ngày 06/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 08-09/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 10-12/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn: Trung tâm DBKTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.1	18.8	21.5	63.6
Trong tuần	26.5	19.0	22.7	25.3
Tuần tới	31.0-34.0	21.0-24.0	26.0-29.0	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: Lúa trong khu vực đang ở giai đoạn trổ và phơi màu, với điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 19.0 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh như: dùng các loại thuốc Ofatox 400EC, Actara 25WP, Bassa... phun khi bọ xít phát sinh rõ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh thối đen lép lửng, sâu phao.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn quả non. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thấp, nhiệt

độ dao động từ 19.0 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm, không thực sự thích hợp cho phát triển quả non. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh thối rễ, bọ xít. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ không khí và lượng mưa trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh sương mai, nhện lông nhung.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ quả non. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, nhiệt độ thích hợp giai đoạn này là 23-29°C. Thống kê số liệu khí tượng tuần này cho thấy nhiệt độ dao động từ 19.0 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như: Bascide 50EC; Hoppercin 50EC; Cyper 25EC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên trong khoảng 26.0-29.0 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo tăng (khoảng 30mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Cây ngô: đang giai đoạn phun râu và phát triển bắp, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 19.0 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh phấn đen, sâu gai; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả như: Reasgant 1.8EC, 2WG, 3.6EC, 5EC, 5WG, Ofatox 40EC... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa khu vực Đông Bắc có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh đốm lá lớn, sâu xám.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 19.0 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: nhện đỏ, sâu đục quả. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa dự báo có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây lạc: đang giai đoạn đâm tia - phát triển củ. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 19.0 - 26.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.7°C, tổng lượng mưa là 25.3mm, tương đối phù hợp giai đoạn phát triển này của cây lạc, cần chú ý bệnh lở cổ rễ, rầy mềm. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng; cần lưu ý một số loại sâu: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-80.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng