



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 6 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.5 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 185.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 112.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 44.8\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 140.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-24/6, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 25/6-01/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm TTDBKTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

| Đặc trưng  | Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ ) |           |            | Lượng mưa (mm) |
|------------|---|-----------|------------|----------------|
|            | Tối cao                                   | Tối thấp  | Trung bình |                |
| Tuần trước | 35.1                                      | 28.6      | 31.9       | 72.5           |
| Trong tuần | 33.1                                      | 27.5      | 30.3       | 185.2          |
| Tuần tới   | 36.0-39.0                                 | 26.0-29.0 | 31.0-34.0  | 30.0-60.0      |

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** Lúa hè thu đang giai đoạn đẻ nhánh. Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là  $25 - 31^{\circ}\text{C}$ . Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ  $27.5 - 33.1^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $30.3^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 185.2mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể rắc vôi 60 – 80 kg/ha lúc lúa mới chớm bị bệnh, hoặc dùng 1 số loại thuốc như Kasuran 0,1 – 0,2%. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng trong khi lượng mưa dự báo có xu thế giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu.

**Mía:** tiếp tục giai đoạn đẻ nhánh - vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là  $20-25^{\circ}\text{C}$ . Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 6 dao động từ  $27.5 - 33.1^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $30.3^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 185.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như dùng thuốc Ofatox 400EC, Sumithion 50EC, Supracid 40ND hoặc Bassa 50 EC pha với nước nồng độ 0,1- 0,15% để phun, mỗi hecta dùng 1-

1,5 lít. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, nhiệt độ trung bình dao động từ 31.0-34.0°C, lượng mưa dự báo giảm khoảng 100mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.5 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 185.2mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh (dự báo lượng mưa trong khoảng 30.0-60.0mm) cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: sâu đục ngọn, bọ hung nâu.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá - củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần dao động từ 27.5 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 185.2mm, phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối củ, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun tưới thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim (thuốc Carmanthai 80 WP), hoặc kasumin. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng (nhiệt độ tối cao dự báo 36.0-39.0°C) và lượng mưa dự báo có xu thế giảm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Ngô: trong giai đoạn mới gieo - phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-30°C. Thống kê cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.5 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 185.2mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần tới lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này (nhiệt độ trung bình dự báo 31.0-34.0°C), người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là rau dền, rau đay, đậu cô ve... Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.5 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 185.2mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (nhiệt độ tối cao dự báo 36.0-39.0°C), lượng mưa giảm mạnh (khoảng 100mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau.

Cây ăn quả có múi: đang giai đoạn phát triển quả. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.5 - 33.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.3°C, tổng lượng mưa là 185.2mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện sâu bệnh có thể sử dụng riêng lẻ

(không phối trộn) và luân phiên một trong các loại thuốc thuộc nhóm cúc tổng hợp và dầu khoáng như Cypermethrin, Deltamethrin; có thể phối hợp thuốc nhóm cúc tổng hợp với dầu khoáng để tăng tính hiệu quả và hạn chế tính kháng thuốc của sâu. Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sọc, rệp sáp.


Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 36.0-39.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 36 đến 39 độ C, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng như sử dụng một số biện pháp chống nóng cho cây trồng như lắp đặt hệ thống tưới bằng béc hoặc nhỏ giọt cho cây ăn quả, có thể tưới hàng ngày hoặc 2 ngày/ lần; với những cây ăn quả còn nhỏ, yếu có thể làm lưới che để chống nóng cho cây, ủ gốc giữ ẩm cho cây bằng nhiều cách như: ủ cỏ, rơm rạ, thân cây ngô đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**