



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TÂY BẮC
Tuần 1 tháng 6 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 6 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 23.8 - 32°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C, tổng lượng mưa là 106.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 52.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 33.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-14/6, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng Sơn La, Hoà Bình từ đêm 12/6 đến hết đêm 13/6 có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15-16/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 16/6 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.4	23.7	28.1	54.6
Trong tuần	32.0	23.8	27.9	106.7
Tuần tới	34-37	22-25	28-31	80-150

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: lúa Đông Xuân trà sớm, chính vụ đang trong giai đoạn đở đuôi – thu hoạch; trà chính vụ đang trong giai đoạn trổ - chắc xanh. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm nhẹ so với tuần trước, với mức nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23.8-32°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C, trong khi lượng mưa của khu vực có xu thế tăng mạnh so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 106.7mm). Với điều kiện như trên có thể thấy, tuần này thời tiết của khu vực Tây Bắc khá thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa, tuy nhiên với các diện tích lúa đã chín – thu hoạch khi gặp mưa lớn rất dễ bị đổ dẫn đến khó khăn cho công tác thu hoạch cũng như có khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt thóc về sau. Trong tuần, sâu bệnh hại xuất hiện gây hại chủ yếu trên các trà lúa vụ: rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn...Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, dao động trong khoảng 22-37°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động 80-150mm, chú ý: theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động thu hoạch các diện tích lúa đã chín một cách hợp lý, ngoài ra cần theo dõi diễn biến sâu bệnh hại trên các trà lúa còn lại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Cây ngô: ngô vụ Xuân đang trong giai đoạn phát triển bắp – thu hoạch, ngô vụ Hè thu trong giai đoạn gieo – 2, 6 lá. Trong giai đoạn gieo – 2, 6 lá cây ngô đòi hỏi điều kiện nhiệt độ từ 25-30°C, đất thoáng, không cần nhiều nước để hạt ngô dễ dàng hô hấp. Tuần 1 tháng 6, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 23.8-32.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 106.7mm, điều kiện thời tiết cơ bản khá thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, với các diện tích ngô mới trồng trong tuần khi có mưa lớn cần tiến hành thoát nước kịp thời tránh cho các hạt ngô mới trồng bị úng nước sẽ dẫn tới bị thối hạt. Trong tuần, cây ngô chịu ảnh hưởng của các đối tượng sâu bệnh hại: sâu đục bắp gây hại trên các diện tích ngô xuân, sâu keo mùa thu – sâu xám gây hại trên các diện tích ngô Hè thu. Dự báo tuần 2 tháng 6, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực dao động 80-150mm, chú ý các đối tượng sâu bệnh hại trên cây ngô đồng thời cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để có các biện pháp xử lý kịp thời tránh thiệt hại do mưa lớn.

Cây lạc: tiếp tục giai đoạn phát triển củ - củ già – thu hoạch. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực biến động không nhiều so với tuần trước với mức nhiệt độ không khí trung bình giảm 0.2°C so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tuần này 27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần trước 28.1°C), lượng mưa trong tuần của khu vực tăng mạnh so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 106.7mm, tăng 52.1mm so với tuần trước), điều kiện thời tiết cơ bản phù hợp cho sự phát triển của cây lạc, tuy nhiên, trong trường hợp mưa lớn xảy ra cục bộ, người dân cần phải nhanh chóng thu hoạch các diện tích lạc đã già để tránh lạc ngấm nước sẽ bị mọc mầm hoặc nhanh chóng tháo nước đối với các diện tích lạc đang trong giai đoạn phát triển củ để tránh củ lạc bị úng do ngập nước. Sâu bệnh hại cây lạc trong tuần chủ yếu gây hại trên các diện tích lạc đang phát triển củ: bệnh đốm lá lạc, bệnh gỉ sắt...Dự báo tuần tới thời tiết tiếp tục sẽ có mưa với lượng mưa dao động 80-150mm, cần chú ý theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời ứng phó.

Cây sắn: đang trong giai đoạn phát triển thân lá. Trong giai đoạn này, cây sắn sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 20-32°C. Tuần 1 tháng 6 khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 23.8-32.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 106.7mm, điều kiện thời tiết cơ bản khá thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây sắn chịu tác động của một số đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu: bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng...Tuần 2 tháng 6, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực dao động từ 80-150mm, chú ý tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): tiếp tục giai đoạn phát triển quả. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả có múi sinh trưởng từ 23-29°C và độ ẩm từ 70-80%. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước trong khi lượng mưa của khu vực tăng mạnh so với tuần trước, với mức nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C và lượng mưa đạt 106.7mm, thời tiết tuần này khá thuận lợi cho cây ăn quả sinh trưởng và phát triển. Sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi chủ yếu vẫn là các loại: bệnh rám quả, sâu đục thân/cành, ốc sên nhỏ...Dự báo tuần sau nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 28-31°C, lượng mưa dự báo của khu

vực dao động 80-150mm, lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi và có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây vải: tiếp tục giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Tuần 1 tháng 6, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23.8-32.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 106.7mm. Với điều kiện như trên có thể nhận thấy nhiệt độ tuần này khá phù hợp cho sự phát triển của cây vải, tuy nhiên trong tuần thời tiết có mưa dẫn tới quả vải chín bị nứt ảnh hưởng đến mẫu mã của quả vải, hiện tại miền bắc đã bắt đầu vào mùa mưa nên người dân cần khẩn trương thu hoạch các diện tích vải chín để tránh ảnh hưởng do mưa gây ra. Các đối tượng gây hại trên cây vải trong tuần không đáng kể: chủ yếu vẫn là đối tượng sâu đục quả. Tuần 2 tháng 6 dự báo khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa với lượng mưa 80-150mm, người dân cần chú ý tiếp tục thu hoạch các diện tích vải còn lại.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Cây chè phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ không khí trung bình từ 18-23°C, độ ẩm không khí trung bình >80%. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm nhẹ trong khi lượng mưa của khu vực có xu thế tăng, với mức nhiệt độ của khu vực dao động 23.8-32.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 106.7mm. Điều kiện nhiệt độ tương đối cao khiến cho cây chè kém phát triển. Sâu bệnh hại cây chè chủ yếu vẫn là các đối tượng bọ xít muỗi, rầy chổng cánh... Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tiếp tục xu thế tăng với mức nhiệt độ cao nhất dao động 34-37°C, lượng mưa của khu vực dao động 80-150mm, chú ý tiếp tục theo dõi diễn biến các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 22 - 37°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động 28-31°C, tổng lượng mưa của khu vực dao động 80-150mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa của khu vực tương đối cao. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ dinh dưỡng, chủ động các biện pháp chống nóng cho cây trồng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng