



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC ĐÔNG BẮC  
Tuần 1 tháng 7 năm 2021**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 7 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $2.9^\circ\text{C}$  tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $4.9^\circ\text{C}$  tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $0.5^\circ\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $0.9^\circ\text{C}$  tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 34.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 22.9$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 22.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ ngày 14-15/7 và từ ngày 18-21/7 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung chủ yếu ở vùng núi). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.2	25.1	28.1	111.7
Trong tuần	29.6	24.6	27.1	77.5
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	40.0-70.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:

**Cây lúa:** lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn đẻ rộ, điều kiện thời tiết phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa giai đoạn này là 25-33°C. Thống kê số liệu các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc: Bassa 50EC, Trebon 20ND, Admire 50EC, Actara 25WWG... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5 - 31.5°C), lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn thu hoạch, một số diện tích đã thu hoạch xong đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm, phù hợp cho giai đoạn phát triển này của vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25EC; Sutin 5EC; Oshin

20WP; Cruiser plus 312,5PS,... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần sau có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, nhện lông nhung.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả, ở nhiệt độ cao quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm Zinkicide, có thành phần chính là nano Kẽm (ZnO) khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 28.5-31.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp.

Cây ngô hè thu: đang ở giai đoạn 9 lá - xoáy nõn, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C. Thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Vibas 10 H, Vicarp 4 H, Vifurasn 3G, Padan 95SP,... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, lưu ý một số sâu bệnh: bệnh ung thư ngô, bệnh đốm lá lớn.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Saikumi 39.35SC, Sec Saigon 25EC, Sapen Alpha 5EC, Comda Gold 5WG... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo tăng lên trong khoảng 28.5-31.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp từ 20-32°C. Thống kê số liệu khí tượng thực đo từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.6 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 77.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Visa 5G, Vifu - Super 5G, Virofos 20EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.


Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33 đến 36 độ C, do đó cây trồng cần được chú ý lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**