



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Tuần 2 tháng 7 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 16.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 20.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 48.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 13.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-25/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông đến ngày 24/7, sau có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 26-27/7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 28-31/7, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng đồng bằng và trung du ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.6	24.6	27.1	77.5
Trong tuần	31.5	24.0	27.8	61.3
Tuần tới	34.0-37.0	24.0-27.0	29.0-32.0	70.0-150.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa mùa sớm trong khu vực: đang ở giai đoạn cuối đẻ và làm đòng, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 30-33°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc: DupontTMprevathon 5SC, Virtako 40WG, Alocbale 40EC, Regent 800WG, Enasin 32WP... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh đạo ôn, sâu xám.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Diện tích vải sau khi thu hoạch cần tiến hành cắt tỉa cành và

bón phân để tạo điều kiện tốt nhất cho cây hồi phục, bước sang giai đoạn phát triển lộc. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Boócđô 1%, Alirette 80WP 0,3%, Rovral 50 WP, ... Số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ có xu hướng tăng với nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-150mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết rû cây, bọ xít nâu.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả, thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole+Difenoconazole... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa dự báo đều có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.

Cây ngô: ở giai đoạn trổ cờ, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C. Theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manthane M46, Juliet 80WP phun kỹ, Foraxyl 35 WP,... Theo số liệu dự báo nhiệt độ tối cao dự báo tăng trong khoảng 34.0-37.0°C và lượng mưa dự báo tăng trong khoảng 70.0-150.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại.

Các loại rau màu khu vực Đông Bắc: đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC,... Số liệu dự báo tuần tới cho thấy nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-150.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ cho sắn phát triển là 20-32°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.0 - 31.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.8°C, tổng lượng mưa là 61.3mm, điều kiện khí hậu thuận lợi cho sắn phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh:

bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Sagolex, Bassan, Trebon, Confidor, Cypermethrin,... Dự báo nhiệt độ và lượng mưa khu vực Đông Bắc tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 70.0-150.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34 đến 37 độ C. Cây trồng cần được chú ý lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng