



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 7 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng .7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 97.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 37.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 63.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-07/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Từ đêm 07-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.5	24.0	27.8	61.3
Trong tuần	29.6	24.7	27.2	158.5
Tuần tới	31.0-34.0	23.0-27.0	27.0-30.5	70.0-120.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn trổ - ngâm sữa, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Theo số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, với nhiệt độ dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Boócđô 1%, Alirette 80WP 0,3%, Rovral 50 WP... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng với nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng

27.0-30.5°C và lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi: khu vực Đông Bắc đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả, ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng thực đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tia cành, cắt tia cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo tăng lên trong khoảng 27.0-30.5 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh cháy gôm, rệp sáp bông.

Cây ngô: đang ở giai đoạn trỗ cờ với nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C. Thống kê số liệu từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Ababetter 1.8 EC, Regent 1.8EC, Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhậy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Azadirachtin, Emamectin Benzoate, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo tăng lên trong khoảng 27.0-30.5°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-120.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây sắn: tiếp tục giai đoạn phát triển thân lá với nhiệt độ thích hợp trong khoảng 20 -32°C. Thống kê số liệu khí tượng khu vực Đông Bắc cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.7 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 158.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP liều lượng từ 14 gram/16 lít nước hoặc Osago 80WG liều lượng 10 gram/16 lít nước, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút;


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 70.0-120.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nhiệt độ thay đổi không đáng kể, lượng mưa có xu hướng giảm. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng chăm sóc cây trồng, người dân cần sử dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng