



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 8 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng lượng mưa là 83.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 75.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 17.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 51.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 15 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ ngày 14-15/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 19-21/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.6	24.7	27.2	158.5
Trong tuần	30.4	25.1	27.7	83.1
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	90.0-180.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa mùa sớm trong khu vực: đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng, với điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 20-38°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng lượng mưa là 83.1mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh đốm vòng, ốc brou vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Aviso 350SC, Manozeb 80WP, Ridozeb 72WP, ... Số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 90.0-180mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, nhiệt độ dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng

lượng mưa là 83.1mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Boócđô 1%, Alirette 80WP 0,3%, Rovral 50 WP, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng tăng với nhiệt độ dự báo trung bình dao động trong khoảng 28.5-31.5°C, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng lượng mưa là 83.1mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét.

Cây ngô: ở giai đoạn trổ cờ - phun râu, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng lượng mưa là 83.1mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manthane M46, Juliet 80WP phun kỹ, Foraxyl 35 WP,... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với lượng mưa dự báo trong khoảng 90.0-180.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cây rau màu khu vực Đông Bắc: đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng lượng mưa là 83.1mm, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với lượng mưa dự báo trong khoảng 90.0-180.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển thân lá với nhiệt độ phù hợp cho sắn phát triển giai đoạn này từ 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.1 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.7°C, tổng lượng mưa là 83.1mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP liều lượng từ 14gram/16 lít nước hoặc Osago 80WG liều lượng

10 gram/16 lít nước,...Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ, sùng trắng.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 90.0-180.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có lượng mưa dự báo tăng mạnh, người dân cần có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời cho cây trồng khi có mưa lớn xảy ra như khơi thông mương dẫn nước, đồng thời có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng