



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Tuần 3 tháng 8 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.3 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 78.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 19.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 16.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 04-06/9, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.0	26.9	30.4	78.4
Trong tuần	33.7	26.3	30.0	78.3
Tuần tới	32.0-35.0	22.0-25.0	27.0-30.0	70.0-120.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 3 tháng 8 diện tích lúa trong khu vực đang ở giai đoạn trổ - phơi màu; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là $25-32^{\circ}$. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt độ tuần này dao động từ $26.3 - 33.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C , tổng lượng mưa là 78.3mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25WG, Asarasuper 250WDG, Wofara 300WG, Onera 300WG... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tối cao dự báo dao động trong khoảng $32.0-35.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-120.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ $26.3 - 33.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C , tổng lượng mưa là 78.3mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole+Difenoconazole. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng $27.0-30.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự

báo trong khoảng 70.0-120.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp với nhiệt độ thích hợp 22 -25°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.3 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 78.3mm, nhiệt độ tương đối cao cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; cần chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-120.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên, nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả, thu hoạch. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 8 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 26.3 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 78.3mm, cần chú ý bệnh phấn trắng, xén tóc; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: quét dọn vườn thông thoáng, ánh sáng xuyên qua được tán lá sẽ hạn chế bệnh, phun Ridomil hoặc Antracol trong giai đoạn này. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh bồ hóng, dơi.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.3 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 78.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manage 5WP, Starsuper 20Wp, Diboxylin 4SL, 8SL... Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 70.0-120.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 8 có nền nhiệt độ dao động từ 26.3 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 78.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validamycin, Pencycuron, Bacillus subtilis,... Dự báo tuần tới lượng mưa trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 26.3 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 78.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh như rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC , Sairifos 585EC, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần tới thay đổi không đáng kể, lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-

120.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sùng trắng, bệnh thối củ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 70.0-120.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ dự báo thay đổi không đáng kể, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc hợp lý và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng