


THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 2 năm 2021


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 6.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 03-06/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 07-11/3, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.7	17.2	20.9	9.6
Trong tuần	26.7	18.1	22.4	2.8
Tuần tới	26.2	18.7	22.4	8.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa Đông Xuân sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh, lúa chính vụ ở giai đoạn bén rễ - đẻ nhánh, lúa muộn giai đoạn cấy - bén rễ. Nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là 25°C đến 30°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần này giảm và nhiệt độ tăng so với tuần trước, tuy nhiên điều kiện thời tiết tuần này vẫn thấp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh virus lúa, sâu đục thân. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp gần như không biến động trong khi lượng mưa tăng, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Mía: Diện tích mía mới trồng đang ở giai đoạn mọc mầm với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 26-33°C, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 2 dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối thấp, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng không đáng kể, dao động từ 18.7- 26.2°C, lượng mưa tăng

khoảng 6mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: rệp, sâu đục thân bốn vạch.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trống đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, thống kê số liệu từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm; dự báo lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông, bệnh héo rũ, ong ăn lá.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn mọc mầm, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 20-27°C, thống kê cho thấy nền nhiệt trong tuần dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu khá phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Theo dự báo lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Ngô xuân: đang trong giai đoạn cây con - 7 lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này trong khoảng 20-30°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm; có thể thấy điều kiện khí hậu phù hợp cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là bí đỏ, bí xanh, mồng tơi... Nhiệt độ tuần này dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ có lượng mưa tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây ăn quả có múi đang ở các giai đoạn lộc xuân - ra hoa. Theo thống kê nhiệt độ tuần này dao động từ 18.1 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 2.8mm, nhiệt độ thích hợp để cây trải qua giai đoạn Xuân Hóa (bước vào phân hóa mầm hoa) vào khoảng 8-17°C, nhiệt độ càng thấp ở giai đoạn này thì thời gian của giai đoạn xuân hóa diễn ra càng nhanh, có thể thấy tuần này nhiệt độ tương đối cao cho quá trình đâm lộc ra hoa của cây ăn trái; với điều kiện thời tiết trong tuần

cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh sẹo, rệp sáp. Dự báo lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.7 - 26.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.4°C, tổng lượng mưa là 8.6mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa tăng; cây trồng cần được chú ý sử dụng biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây và đảm bảo phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng