



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 3 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 18.7 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.4°C, tổng lượng mưa là 42.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 16.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 14.1\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 36.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.2\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 24-27/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh. Từ 28-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.8	14.6	18.2	26.3
Trong tuần	24.1	18.7	21.4	42.4
Tuần tới	20.2	15.5	17.9	6.3

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa trong khu vực: đang ở giai đoạn đẻ nhánh rõ - đứng cái, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là  $25.0-32.0^{\circ}\text{C}$ . Nhiệt độ thấp dưới  $16^{\circ}\text{C}$  hay cao hơn  $38^{\circ}\text{C}$  đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ  $18.7 - 24.1^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $21.4^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là  $42.4\text{mm}$ , có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh, có thể sử dụng một số biện pháp phòng chống sâu bệnh cho lúa như: dùng các loại thuốc Regent 800WG, Hopsan 75EC, Selecron 500EC, vệ sinh đồng ruộng... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh đạo ôn, sâu gai.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải tiếp tục ở giai đoạn phát triển lộc và ra hoa. Nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là từ  $18.0$  đến  $24.0^{\circ}\text{C}$ . Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ  $18.7 - 24.1^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $21.4^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là  $42.4\text{mm}$ , phù hợp cho giai đoạn phát triển lộc và ra hoa trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh sương mai, nhện lông nhung. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển lộc và ra hoa. Nhiệt độ dưới 25.0°C trong nhiều tuần lễ là yêu cầu kích thích mầm hoa. Theo thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 18.7 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.4°C, tổng lượng mưa là 42.4mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông, khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như: Sử dụng một trong những loại thuốc sau: Checsusa 500WP (pha 20g/bình 16 lít nước), Lotoshine 400WP (pha 4g/16 lít nước). Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: đang trong giai đoạn xoáy nõn, nhiệt độ thích hợp từ 20.0 - 30.0°C và thích hợp nhất từ 25.0-28.0°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 18.7 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.4°C, tổng lượng mưa là 42.4mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng giảm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27.0°C. Theo thống kê, tuần này nhiệt độ dao động từ 18.7 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.4°C, tổng lượng mưa là 42.4mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ giảm khoảng 4°C và lượng mưa giảm gần 40mm, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây lạc: đang giai đoạn phát triển thân lá. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24.0-33.0 độ C. Theo thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực Đông Bắc, tuần này nhiệt độ dao động từ 18.7 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.4°C, tổng lượng mưa là 42.4mm, cần chú ý bệnh đốm lá muộn, sâu ăn lá. Số liệu dự báo tuần tới cho thấy nhiệt độ không khí trung bình giảm xuống 17.9°C và lượng mưa giảm gần 40mm, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh đốm lá sớm, rầy mềm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.5 - 20.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 6.3mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm mạnh, nhiệt độ tối thấp có khả năng xuống 15.5°C, do đó cần chủ động các biện pháp chống rét cho rau màu như bổ sung thêm chất dinh dưỡng, phủ ni lông diện tích rau màu chịu rét kém... và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**