



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 3 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 3 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 4.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 5.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 10.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 13.9$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-09/4, có mưa rào và rải rác có dông, riêng đêm 03 và thời kỳ ngày 06-09/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 10-11/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.1	18.7	21.4	42.4
Trong tuần	22.6	14.7	18.6	42.2
Tuần tới	32.0-35.0	22.0-25.0	27.0-30.0	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn đứng cái - phân hoá đòng, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh thối đen lép lửng, sâu phao người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh, có thể sử dụng một số biện pháp như: sử dụng các loại thuốc Penalty 40 WP; Sutin 5EC, 50 WP; Chess 50WG; Palano 600 WP... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh virus lúa, sâu đục thân.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển hoa - đậu quả. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của

cây vải là từ 18-24°C. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, nhiệt độ dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, phù hợp cho giai đoạn ra hoa, thụ phấn tạo quả non trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh đốm lá lớn, sâu gai.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển lộc, ra hoa và đậu quả. Nhiệt độ thích hợp nhất cho giai đoạn này là 23-29°C, theo số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, có thể nhận thấy nhiệt độ tương đối thấp cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn quả có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như: Trebon 0,1%, Copper Oxychloride. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng; cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: Ngô đang ở giai đoạn xoáy nõn - trở cờ, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của ngô là từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh phấn đen, châu chấu; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả, một số biện pháp có thể sử dụng như: phun các loại thuốc trừ bệnh như Thiram 85 WP, Tiptop 250 EC, phun thuốc khi bắt đầu xuất hiện bệnh từ 1 - 5% . Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, theo số liệu thống kê, tuần này nhiệt độ dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang, bệnh chết cây con. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhậy.

Cây lạc: khu vực Đông Bắc đang trong giai đoạn phân cành. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc phát triển trong giai đoạn này từ 25-30 độ C. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Theo thống kê, nhiệt độ tuần này dao động từ 14.7 - 22.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.6°C, tổng lượng mưa là 42.2mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên

hạt. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0 và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc đúng kỹ thuật phù hợp giai đoạn phát triển của mỗi loại cây và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**