



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 18.7 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 33.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 27.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 8.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 31.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-15/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 16-21/3, có nhỏ mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng ngày 21/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.2	17.1	20.1	5.8
Trong tuần	22.7	18.7	20.7	33.3
Tuần tới	25.5	20.9	23.2	1.7

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: diện tích lúa đông xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là $25-31^{\circ}\text{C}$, nên nhiệt độ tuần này dao động từ $18.7 - 22.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C , tổng lượng mưa là 33.3mm, tương đối thấp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: sâu cuốn lá, sâu đục thân hai chấm, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số loại thuốc như: Fanmax 350SC, TT Biomycin 40.5WP... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển lộc và hoa, nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi ra hoa là dưới 20°C . Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ $18.7 - 22.7^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C , tổng lượng mưa là 33.3mm, tương đối thuận lợi cho cây phát triển lộc và ra hoa. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh tàn

lại, rệp sáp đỏ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 23.2 độ C, lượng mưa giảm hơn 30mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh cháy gân, rệp sáp bông.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn 5 - 7 lá, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của ngô là 20 - 30 độ C. Theo thống kê nhiệt độ không khí dao động từ 18.7 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 33.3mm, có thể nhận thấy thời tiết trong tuần không phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh thối thân, sâu cắn lá. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ (hơn 3 độ C) và tổng lượng mưa dự báo giảm so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu gai.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc - hoa, nhiệt độ thích hợp giai đoạn này là 18 - 24°C. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 3 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 18.7 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 33.3mm, có thể thấy điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho nhãn phát triển. Cần lưu ý bệnh cháy lá, bọ xít trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Theo thống kê nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.7 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 33.3mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng trong khi lượng mưa giảm gần 30mm. cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, nhện nâu.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 1 tháng 3 có nền nhiệt độ dao động từ 18.7 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 33.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện đỏ, bệnh thối thân.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn cây con - 3 lá. Theo thống kê tuần này có nền nhiệt độ dao động từ 18.7 - 22.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 33.3mm, cần chú ý sâu bệnh như: bệnh thối mầm, bệnh rỉ sắt. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng trong khi lượng mưa giảm gần 30mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh héo cây con, sâu ăn tạp.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.9 - 25.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.2°C, tổng lượng mưa là 1.7mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng (hơn 3°C) và lượng mưa giảm (gần 30mm); cây trồng cần được chú ý chăm sóc đúng biện pháp kỹ thuật và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng