



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC VIỆT BẮC
Tuần 1 tháng 3 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 16.1 - 21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, tổng lượng mưa là 9.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.6 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-13/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 14-15/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 16-21/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 21/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.0	14.9	18.4	5.8
Trong tuần	21.5	16.1	18.8	9.2
Tuần tới	24.3	17.8	21.0	12.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa chiêm xuân: đang trong giai đoạn bén rễ - hồi xanh, đẻ nhánh – đẻ rộ, hiện các diện tích lúa trong khu vực đang sinh trưởng ở mức trung bình. Trong giai đoạn đẻ nhánh nhiệt độ thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển 25-32°C. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 9.2mm. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuần này, thời tiết khu vực có mưa phùn, độ ẩm cao khiến cho bệnh đạo ôn lá phát triển mạnh gây hại hầu hết trên các trà lúa. Ngoài việc phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần lưu ý tiếp tục bổ sung nước cho cây lúa theo phương pháp “Uớt, khô xem kẽ”. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế tăng, cần tiếp tục lưu ý nhu cầu nước cho cây lúa cũng như một số đối tượng sâu bệnh có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại: bệnh đạo ôn, rầy các loại, tuyến trùng hại,...

Cây ngô xuân: khu vực Việt Bắc đang trong các giai đoạn gieo – 2 lá, 5-7 lá. Trong giai đoạn này nhiệt độ thích hợp cho cây ngô phát triển từ 25-28°C, độ ẩm thích hợp từ 65-70%, đất tơi xốp và thông thoáng đảm bảo cung cấp đủ oxy cho rễ phát triển. Tuần này, nền nhiệt của khu vực nằm trong khoảng từ 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực 9.2mm. Nền nhiệt độ tương đối thấp là điều kiện không thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, sâu keo mùa thu tiếp tục là đối tượng sâu bệnh gây hại chính cho cây ngô. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần này (khoảng 2.2°C), lượng mưa dự báo đạt 12.4mm, cần tiếp tục chú ý các loại sâu bệnh hại có khả năng phát sinh: sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá...

Lạc xuân: cây lạc xuân trong khu vực chủ yếu đang trong giai đoạn mới trồng – 3 lá. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển từ 25-33°C. Tuần 1 tháng 3 khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ thay đổi không nhiều so với tuần 3 tháng 2, dao động trong khoảng 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực 9.2mm. Trong tuần, thời tiết không se lạnh, nhiều ngày có mưa phùn, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại phát triển như: sâu xám, bệnh lở cổ rễ... Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh, người dân cần lưu ý tiến hành bón thúc đợt 1 đối với các diện tích lạc đã đc 3-4 lá thật, trong quá trình bón cần kết hợp xới xáo ruộng và làm sạch cỏ dại giúp đất được tơi xốp hơn đồng thời tránh được tình trạng cỏ dại hút hết chất dinh dưỡng của cây lạc. Tuần sau, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế tăng, khả năng tiếp tục xảy ra các đợt mưa phùn khiến thời tiết nồm ẩm, cần chú ý tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây cà chua: trong giai đoạn thu hoạch. Cây cà chua là loại cây chịu ẩm, nhiệt độ thích hợp cho cây cà chua triển từ 21 – 24°C. Tuần này nhiệt độ của khu vực dao động 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 9.2mm. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích cà chua đã chín. Tuy nhiên, trong tuần, mặc dù tổng lượng mưa của khu vực không đáng kể song vẫn có những ngày mưa phùn khiến độ ẩm của không khí cao làm gia tăng một số sâu bệnh hại: bệnh sương mai, bệnh thán thư, bệnh thối loét cà chua. Sang tuần dự báo, nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế tăng nhẹ, cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh hại cà chua: bệnh thán thư, bệnh sương mai, bệnh nứt quả...

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Chè là loại cây có yêu cầu điều kiện nhiệt độ không khí trung bình hàng năm 18-23°C và độ ẩm không khí trung bình >80%. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực không đáng kể 9.2mm. Điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho cây chè phát triển. Tuy nhiên, cần chú ý tuần này lượng mưa của khu vực khá nhỏ, người dân cần bảo đảm nhu cầu nước cho cây chè đồng thời lưu ý một số sâu bệnh hại chính: bệnh thối búp, rầy xanh. Dự báo tuần tiếp theo, nhiệt độ của khu vực nhẹ so với tuần này, người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại: bọ cánh tơ, nhện đỏ.

Cây cam, quýt (Hà Giang): trong khu vực đang trong giai đoạn phát triển lộc – ra hoa. Nhiệt độ tốt nhất cho sinh trưởng của các đợt lộc trong mùa xuân là từ 12 – 20°C. Trong tuần nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực 9.2mm. Điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho cây cam, quýt ra lộc – hoa. Trong tuần bệnh chảy gôm, bệnh sẹo, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục gây hại trên cây trồng. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ, dao động trong khoảng 17.8 - 24.3°C, lượng mưa có xu thế tăng, cần tiếp theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây nhãn, vải: đang trong giai đoạn phát triển lộc – ra hoa. Nhiệt độ cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây nhãn, vải từ 16 - 28°C. Trong giai đoạn ra hoa, nhiệt độ thích hợp cho cây nhãn vải từ 18-24°C. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc tăng không đáng kể so với tuần trước, dao động trong khoảng 16.1-21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, lượng mưa của khu vực 9.2mm. Điều kiện nhiệt độ tương đối thuận lợi cho cây nhãn, vải ra hoa. Tuy nhiên trong tuần, một số ngày thời tiết mưa phùn làm cho độ ẩm không khí cao, dẫn đến một số đối tượng sâu bệnh hại phát triển mạnh: bệnh thán thư, bệnh phấn trắng, bệnh sương mai. Tuần sau, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực tiếp tục có xu thế tăng nhẹ, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại: bệnh sương mai, bệnh chổi rồng, nhện đỏ...


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.8 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21°C, tổng lượng mưa là 12.4mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa tăng không đáng kể. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu nước, phân bón và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng