



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 19 - 24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa là 70.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 61.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 23.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 57.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.2 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/3, có mưa vài nơi; riêng đêm 21/3 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Từ 24-26/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Từ 27-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.5	16.1	18.8	9.2
Trong tuần	24.3	19.0	21.6	70.5
Tuần tới	22.8	15.4	19.1	13.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa chiêm xuân: đang trong các giai đoạn cây – bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh – đứng cái. Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này từ 25-32°C. Nền nhiệt độ khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 3 dao động trong khoảng 19.0-24.3°C, tổng lượng mưa của khu vực tăng mạnh 70.5mm, điều kiện nhiệt độ không thực sự thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý: theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại chủ yếu (bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ,..) và bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa theo từng giai đoạn. Dự báo, tuần tới nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm nhẹ (trung bình 2.5°C), dao động từ 15.4-22.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực giảm mạnh đạt 13.3mm. Chú ý một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm nâu, bệnh vàng lá sinh lý...phát sinh gây hại.

Cây ngô xuân: cây ngô trong khu vực Việt Bắc đang trong các giai đoạn cây con – 3 lá, 5 lá – xoáy nõn. Điều kiện thích hợp cho cây ngô phát triển ở nhiệt độ 20-30°C, độ ẩm khoảng 65-70%. Theo số liệu thống kê thực đo, nhiệt độ của khu vực Việt Bắc tuần này tăng đáng kể so với tuần trước (trung bình 2.8°C) dao động trong khoảng 19.0-24.3°C, tổng lượng mưa của khu vực tăng mạnh 70.5mm, điều kiện thời tiết khá

thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Trong tuần Sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn tiếp tục là các đối tượng phát sinh gây hại chủ yếu trên cây ngô. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực giảm, nhiệt độ dao động trong khoảng 15.4-22.8°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực đạt 13.3mm. Chú ý các đối tượng sâu bệnh có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân...

Cây lạc xuân: đang trong giai đoạn gieo – phát triển thân lá. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển từ 25-30°C. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động 19.0-24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa của khu vực tăng mạnh 70.5mm, điều kiện nhiệt độ không thực sự thích hợp cho cây lạc phát triển. Trong tuần, cây lạc chịu ảnh hưởng của các loại sâu bệnh hại chủ yếu: bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá lạc, bệnh gỉ sắt.... Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hại cần thường xuyên dọn dẹp cỏ dại, xới nhẹ luống lạc, tiến hành bón lót khi cây lạc đã đủ 3-4 lá thật. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, cần tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh hại trên cây lạc để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây cam (Hà Giang): đang trong giai đoạn phát triển lộc – hoa. Điều kiện nhiệt độ thích hợp cho cây cam phát triển 23-29°C. Tuần 2 tháng 3 khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng đáng kể so với tuần trước (trung bình khoảng 2.8°C), dao động trong khoảng 19.0-24.3°C, tổng lượng mưa của khu vực tăng mạnh 70.5mm. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây cam phát triển. Cần chú ý các đối tượng sâu bệnh hại trong tuần: Sâu đục quả, bệnh loét, bệnh se...phát sinh gây hại. Dự báo, tuần tiếp theo, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, chú ý bảo đảm nhu cầu nước cho cây cam trong thời kỳ ra lộc – hoa, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc – hoa. Nhiệt độ thích hợp cho cây nhãn sinh trưởng và phát triển là từ 21 – 27°C. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc dao động 19.0-24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa của khu vực tăng mạnh 70.5mm, điều kiện nhiệt độ tương đối thích hợp cho cây nhãn phát triển. Trong tuần cây nhãn chịu ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại: bệnh chồi rồng, bọ xít con, nhện long nhung...Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực đều có xu thế giảm, cần chú ý nhu cầu nước của cây nhãn trong thời kỳ lộc – hoa đồng thời cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại.

Cây chè (Thái nguyên): trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Cây chè có yêu cầu điều kiện nhiệt độ không khí trung bình hàng năm 18-23°C và độ ẩm không khí trung bình >80%. Theo thống kê từ số liệu thực đo cho thấy, tuần này nền nhiệt độ của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước, dao động trong khoảng 19.0-24.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 70.5mm. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây chè phát triển. Trong tuần: Sâu cuốn lá non, sâu cuốn búp...tiếp tục phát sinh gây hại trên cây chè. Dự báo tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm, dao động trong khoảng 15.4 - 22.8°C, lượng mưa của khu vực giảm

lượng 13.3mm. Cần tiếp tục theo dõi diễn biến của một số sâu bệnh hại chủ yếu: bọ xít bông, sâu nhóm kèn..

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.4 - 22.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.1°C, tổng lượng mưa là 13.3mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu nước, dinh dưỡng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng