



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 1 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 11.2 - 16.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.7°C, tổng lượng mưa là 40.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 4.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 10.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 25.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-05/02, có mưa vài nơi, riêng ngày 02/02 khu vực vùng núi có mưa rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ đêm 05-06/02 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 07-11/02, có mưa vài nơi, riêng đêm 07-08/02 có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.5	11.9	14.2	42.0
Trong tuần	16.3	11.2	13.7	40.7
Tuần tới	19.0-22.0	9.0-12.0	14.0-17.0	10.0-20.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Lúa cấy	Bén rễ hồi xanh	Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-30 độ C; có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần không phù hợp cho lúa phát triển, cần có biện pháp chống rét cho lúa như che phủ nilon trắng, ủ rơm rạ, đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh thối gốc, sâu phao; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Vải		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động trong khoảng từ 11.2 - 16.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.7°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, cần lưu ý

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần lựa chọn biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ăn quả		Thu hoạch	Số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 11.2 - 16.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.7°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Ngô	Xuân	Gieo trồng	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-30 độ C, thống kê cho thấy nền nhiệt trong tuần thấp - không thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 14.0-17.0 độ C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0 độ C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép và đúng liều lượng.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động trong khoảng từ 11.2 - 16.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.7°C, tổng lượng mưa là 40.7mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh gây hại.
Cây khoai tây		Phát triển củ - thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 9.0-12.0 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, mốc sương; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 9.0-12.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 14.0-17.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo nền nhiệt khu vực Đông Bắc vẫn thấp với nhiệt độ tối thấp dưới 15 độ C, do đó, cây trồng bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hiệu quả thì cần sử dụng các biện pháp phòng chống rét như: tưới nước thường xuyên, cung cấp nước đủ ẩm để giữ ẩm cho cây. Kết hợp ủ gốc cho cây bằng rơm rạ hoặc trấu gạo hoặc tro bếp.

**THỰC HIỆN:** Quách Thị Thanh Tuyết

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng