



Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 1 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 31.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 9.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 31.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 22-24/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 24-27/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 27-30/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 29-30/01 trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	18.6	14.1	16.3	22.7
Trong tuần	16.6	11.1	13.8	54.4
Tuần tới	24.0-27.0	11.0-14.0	17.5-20.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân sớm	Gieo - 5 lá	Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là độ 25-30 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp
Cây ăn quả		Phát triển quả, thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sọc, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp cho từng loại cây.
Cây ngô	Đông	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			tượng tuần 3 dao động trong khoảng 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp
Nhãn		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: quét dọn vườn thông thoáng, ánh sáng xuyên qua đọt tán lá sẽ hạn chế bệnh
Cây chè		Đón - chăm sóc	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc sâu theo hướng dẫn cho chè.
Rau màu	Đông	Phát triển củ - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-20.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh, tránh lây lan sang diện tích khác
Sắn	Đông	Thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sắn.
Lạc	Đông	Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 11.1 - 16.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.8°C, tổng lượng mưa là 54.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muôn, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-

14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-20.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ thấp, các cây trồng cần có biện pháp chống rét hiệu quả như: luôn giữ ẩm cho luống mạ, không nên để luống mạ khô hạn, khi nhiệt độ dưới 15°C vào ban đêm; nên cho nước vào trong ruộng ngập 1/2 - 1/3 chân mạ, để giữ ẩm cho cây mạ được khỏe mạnh, đến sáng thì nên rút cạn nước trong ruộng và phủ kín nilong lên trên mặt luống đồng thời sử dụng biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng