



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 1 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 14 - 20.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.3°C, tổng lượng mưa là 22.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 4.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 9.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 5.1$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 3.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-05/02, có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 02/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ đêm 05-06/02 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 07-12/02, có mưa vài nơi, riêng ngày 08/02 có mưa rải rác. Trời rét có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.8	13.5	16.6	31.8
Trong tuần	20.6	14.0	17.3	22.1
Tuần tới	21-24	08-11	14.5-17.5	20-40

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông xuân 2021-2022	Mạ (mới gieo – 3, 5 lá) Lúa sạ (gieo – 3 lá, đẻ nhánh) Lúa cấy (cây - bển rể, hồi xanh)	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, trong tuần này khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng (0.7°C), lượng mưa giảm (9.7mm) so với tuần trước. Điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực tiếp tục ảnh hưởng không tốt tới sinh trưởng của cây lúa. Do đó, người dân cần tiếp tục lưu ý: bảo đảm giữ ẩm cho cây lúa và bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa theo từng giai đoạn là yêu cầu rất cần thiết để bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng tốt. Trong tuần, cây lúa chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh: bệnh đạo ôn, rầy các loại, bọ trĩ...
Cây ngô	Đông 2021	Phát triển bắp – thu hoạch	Tuần 3 tháng 1, khu vực Tây Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến

	Xuân 2022	Gieo trồng	cho nền nhiệt độ của khu vực tương đối thấp (nhiệt độ trung bình đạt 17.3°C), lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 22.1mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh và ít mưa, cây ngô sinh trưởng kém. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý tưới thêm nước kết hợp bón phân Lân và Kali (nhất là những diện tích ngô Xuân mới trồng) để giúp cây tăng khả năng chống chịu với thời tiết lạnh. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: bệnh chết héo, sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh vàng lá...
Cây khoai tây		Phát triển củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây khoai tây tiếp tục trong các giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích khoai tây đã đạt thành phẩm. Đối với các diện tích khoai tây đang trong giai đoạn phát triển củ, cần lưu ý tưới bổ sung nước cho cây. Bệnh nứt củ, bệnh ghẻ củ, bệnh xoắn lá lùn... tiếp tục là các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây khoai tây trong tuần cần chú ý.
Cây sắn	Niên vụ 2021	Thu hoạch	Cây sắn trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch nốt các diện tích sắn củ còn lại. Trong tuần, điều kiện thời tiết của khu vực Tây Bắc rất thuận lợi cho việc thu hoạch và chế biến các diện tích sắn củ đã già. Sâu bệnh gây hại trên cây sắn trong tuần không đáng kể do đại đa số diện tích sắn đã cho thu hoạch. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch cũng như dọn dẹp sạch sẽ ruộng đất để hạn chế sâu bệnh hại cho vụ sau.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 14.0-20.6°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 22.1mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực rất phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần không đáng kể, chủ yếu là các đối tượng sâu đục thân/cành...
Cây nhãn		Phát triển lộc	Tuần 3 tháng 1, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 17.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 22.1mm. Cây nhãn tiếp tục giai đoạn phát triển lộc. Điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương

			đôi phù hợp cho cây nhãn trong giai đoạn này, chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: sâu tơ, sâu đo, nhện, rệp...
Cây chè		Đốn – chăm sóc	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp khiến cho cây chè sinh trưởng kém. Trong giai đoạn đốn – chăm sóc, cần chú ý đốn cây, tía bỏ các cành sâu bệnh, cành tăm, cành trong tán để giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại và giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh. Sâu bệnh gây hại trên cây chè trong tuần không đáng kể do thời tiết lạnh.

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 8.0 – 24.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.5-17.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm. Do đó, có thể nhận thấy trong tuần tới, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ thấp (khả năng xuống tới 8.0°C), lượng mưa của khu vực tương đối thấp. Các cây trồng cần được chú ý giữ ấm, đặc biệt là cây lúa, cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 3cm để giữ ấm cho cây, những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C không nên gieo mạ để bảo đảm cây mạ sinh trưởng tốt nhất; tiếp tục chú ý phòng trừ các đối tượng ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy các loại phát sinh gây hại trên cây lúa. Đối với các diện tích mạ đã gieo chưa cấy, cần dùng nilong che phủ lên trên luống mạ, dùng tro phủ lên luống mạ để giúp giữ ấm cho cây mạ trong những ngày trời rét (những ngày trời ấm lên cần chú ý mở nilong để giúp cây mạ dễ dàng hô hấp). Đối với các nhóm cây trồng vụ Đông 2021 (ngô, lạc, khoai tây, sắn...) cần khẩn trương thu hoạch để chuẩn bị đất trồng cho vụ tiếp theo. Đối với các nhóm cây vụ Xuân 2022 mới gieo trồng và các loại cây trồng khác cần chú ý giữ ấm, bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại hiệu quả.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng