



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 13 - 17.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.1°C, tổng lượng mưa là 44.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 10.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 9.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 21.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-05/02, có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 02/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ đêm 05-06/02 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 07-12/02, có mưa vài nơi, riêng ngày 08/02 có mưa rải rác. Trời rét có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTT Quốc Gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.6	11.1	13.8	54.4
Trong tuần	17.3	13.0	15.1	44.2
Tuần tới	19-22	08-11	13.5-16.5	15-30

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông xuân 2021-2022	Mạ (mới gieo - 3, 5 lá) Lúa sạ (gieo - 3 lá, đẻ nhánh) Lúa cấy (cây - bẻ rễ, hồi xanh)	Tuần này, khu vực Việt Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực rất thấp (thấp nhất đạt 13.0°C), cùng với đó lượng mưa trong tuần của khu vực chỉ đạt 44.2mm. Trong điều kiện thời tiết nói trên, cây lúa sinh trưởng kém, người dân cần đặc biệt lưu ý: bảo đảm giữ ấm cho cây lúa trong những ngày thời tiết giá rét (đối với các diện tích mạ mới gieo cần dùng nilong để phủ lên trên luống mạ, đối với các diện tích lúa cấy thì nên bón thêm phân lân và kali để giúp cây lúa tăng khả năng chống chịu với thời tiết lạnh; bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lúa theo từng giai đoạn. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa

			trong tuần: sâu cuốn lá, rầy các loại, bệnh đạo ôn...
Cây ngô	Đông 2021	Phát triển bắp – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 13.0-17.3°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 44.2mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Đối với các diện tích ngô còn lại (nhất là ngô Xuân mới trồng, thời tiết lạnh và mưa ít là điều kiện không thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng tốt, người dân chú ý tưới nước kết hợp bón phân bổ sung (Lân và Kali) để giúp cây ngô sinh trưởng tốt và tăng khả năng chống chịu với thời tiết lạnh. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh chết héo, sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh vàng lá...
	Xuân 2022	Mới trồng	
Cây cà chua		Hoa - thu hoạch	Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết tuần này của khu vực tiếp tục lạnh và mưa ít khiến cho cây cà chua sinh trưởng kém (ảnh hưởng tới số lượng hoa, gây hiện tượng rụng hoa, quả). Sâu bệnh gây hại trên cây cà chua trong tuần: sâu xanh đục quả, ruồi đục lá, rầy... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây cà chua.
Cây sắn	Niên vụ 2021	Thu hoạch	Tuần 3 tháng 1, cây sắn tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch. Điều kiện thời tiết trong tuần tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã già. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nốt các diện tích sắn còn lại, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ ruộng đất để hạn chế sâu bệnh hại lây lan sang vụ tiếp theo.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 15.1°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 44.2mm. Điều kiện thời tiết phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Do đó, người dân cần nhanh chóng thu hoạch các diện tích quả đã chín để chuyển sang giai đoạn chăm sóc, giúp cây nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch quả. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần:

			sâu đục thân/cành, sâu đục quả...
Cây vải		Phát triển lộc	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, trong tuần này do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực tương đối thấp. Cây vải trong tuần tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Chú ý, trong giai đoạn này một số vườn vải có cây bắt đầu phát mầm hoa ở ngọn, cần theo dõi nếu phát hiện lá mọc kèm khi mầm hoa dài trên 5cm thì cần lưu ý ngắt bỏ lá, đồng thời tiến hành bón thúc hoa. Trong tuần, cây vải chịu tác động bởi một số đối tượng: sâu đục thân, bệnh xém mép lá.....
Cây chè		Đón – chăm sóc	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp là điều kiện không thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây chè. Trong giai đoạn này, cần tiếp tục đón cây, tia bỏ cành già cỗi, cành tăm, cành kém phát triển để giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp cho cây luôn duy trì trạng thái sinh dưỡng của cây. Trong tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho sâu bệnh gây hại trên cây chè không đáng kể.

Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 8.0- 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.5-16.5°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm. Do đó, có thể nhận thấy, trong tuần tiếp theo khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Một số lưu ý đối với các loại cây trồng như sau: Đối với cây mạ, cần chú ý giữ ẩm cho mạ (sử dụng nilong để che phủ lên trên luống mạ để giúp giữ ẩm cho cây mạ, khi trời ẩm lên cần mở nilong để cây mạ hô hấp); chú ý bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại xuất hiện gây hại. Đối với lúa cấy, tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây lúa thì cần bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa vừa tránh khô hạn vừa giúp giữ ẩm cho cây lúa trong những ngày trời rét. Đối với các cây trồng vụ Đông 2021 (ngô lạc, đậu tương, cà chua...) cần nhanh chóng thu hoạch các diện tích đã đạt thành phẩm; sau thu hoạch cần nhanh chóng cày bừa, làm giằm, phơi ải đất chuẩn bị gieo trồng vụ Xuân để hạn chế nguồn sâu, bệnh gây hại; Đối với các loại cây trồng vụ Xuân 2022 mới gieo trồng, cần chú ý các biện pháp giúp giữ ẩm cho cây (dùng rơm rạ phủ lên luống trồng), ngoài ra cần bảo đảm nhu cầu nước cho cây trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ từ nhiều tuần nay, đồng thời chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Các loại cây trồng khác cần tiếp tục chăm sóc, bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng