



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 17.7 - 26.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 5.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/10-11/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét; riêng đêm nay và ngày 02/11 trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.0	16.3	20.6	5.9
Trong tuần	26.2	17.7	21.9	5.8
Tuần tới	28.0-31.0	14.0-17.0	21.0-24.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Chín – thu hoạch – thu hoạch xong	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 17.7-26.2°C; tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 5.8mm. Trong điều kiện thời tiết mưa gần như không có, việc thu hoạch các diện tích lúa đã chín diễn ra thuận lợi. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp ruộng đất, để chuyển sang gieo trồng các cây vụ Đông cho kịp với khung lịch thời vụ. Do đại đa số các diện tích lúa đã cho thu hoạch, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa không đáng kể,

			chủ yếu một số đối tượng: chuột, bệnh đen lép hạt...
Cây ngô	Hè thu	Chín – thu hoạch	Cây ngô là loại cây sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 24.0-34.0°C. Trong tuần, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 21.9°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 5.8mm. Trong điều kiện thời tiết se lạnh và mưa rất thấp, sinh trưởng của cây ngô trong kém hơn (nhất là cây ngô Đông mới trồng) nên cần phải tưới bổ sung thêm nước cho cây ngô; đối với các diện tích ngô Hè thu đã chín cho thu hoạch, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích ngô Hè thu đã đạt thành phẩm. Trong tháng, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu đục bắp, châu chấu, rệp hại cò... phát sinh gây hại trên các diện tích ngô Hè thu; châu chấu, sâu xám, sâu keo mùa thu... phát sinh gây hại trên các diện tích ngô Đông.
	Đông	Mới trồng – cây con - 8 lá – xoáy nõn	
Cây lạc	Hè thu	Chắc củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn chắc củ - thu hoạch. Tổng lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 5.8mm, rất thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lạc củ đã cho thu hoạch. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch các diện tích lạc củ đã cho thu hoạch để nhanh chóng giải phóng ruộng đất để tiến hành gieo trồng các cây trồng vụ Đông cho kịp với khung lịch thời vụ. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các diện tích lạc Hè thu trong tuần không đáng kể do đại đa số diện tích lạc đã cho thu hoạch; các diện tích chưa thu hoạch chủ yếu chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt, sâu cuốn lá...

Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	Tuần 3 tháng 10, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần trước (với mức biến động của nhiệt độ không khí trung bình 1.3°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 20.6°C); tổng lượng mưa trong tuần của khu vực cơ bản tương đương với tuần trước. Trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa, cây sắn sinh trưởng kém hơn nên cần tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn để đảm bảo nhu cầu về nước của cây. Trong tuần, đối tượng bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn, người dân cần tiếp tục kiểm tra và phát hiện các diện tích đã bị nhiễm bệnh để tiến hành thu gom và tiêu hủy toàn bộ nhằm hạn chế sự lây lan trên diện rộng của bệnh.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả xanh - quả chín – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 17.7-26.2°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 5.8mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, việc thu hoạch cây ăn quả có múi trong khu vực diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: sâu đục thân, ruồi đục quả, bệnh ghẻ sẹo...
Cây nhãn		Lộc bánh tẻ	Cây nhãn trong tuần đang trong giai đoạn lộc bánh tẻ. Lượng mưa trong tuần của khu vực không đáng kể (đạt 5.8mm), lượng mưa thấp khiến cho cây nhãn sinh trưởng kém hơn nên cần tưới thêm nước bổ sung để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng của cây nhãn cũng như giúp cho quá trình phát triển lộc trên cây nhãn

			diễn ra thuận lợi để bảo đảm trước 15/11 cây nhãn phải bật toàn bộ lộc. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn trong tuần: bệnh sương mai, bệnh thán thư, sâu ăn lộc non... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
Cây chè		Ra búp – tận thu hái	Tuần 3 tháng 10, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 21.9°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 5.8mm. Do lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp khiến cho sinh trưởng của cây chè cũng như tốc độ phát triển búp trên cây chè bị chậm lại gây ảnh hưởng đến năng suất chè thu hoạch được. Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần cần chú ý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 14.0- 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ có xu thế tăng, lượng mưa không đáng kể. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: Tiếp tục thu hoạch các diện tích cây trồng có thể cho thu hoạch; Trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng nhu cầu của cây trồng, cần chủ động nguồn nước để tiến hành tưới bổ sung cho các loại cây trồng; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý cho từng loại cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng; Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng