



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 19.1 - 26.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 21.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 6.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 11.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/10-11/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét; riêng đêm nay và ngày 02/11 trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.3	16.0	19.7	28.2
Trong tuần	26.2	19.1	22.6	21.6
Tuần tới	28.0-31.0	15.0-18.0	21.5-24.5	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Chín – thu hoạch – thu hoạch xong	Đại đa số các diện tích lúa trong khu vực Việt Bắc đã cho thu hoạch, phần diện tích còn lại hiện đang trong giai đoạn chín – thu hoạch. Trong tuần, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 19.1-22.6°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 21.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch nốt các diện tích lúa còn lại. Ngay sau khi thu hoạch xong, nhanh chóng dọn dẹp và vệ sinh lại đồng ruộng sạch sẽ để tiến hành gieo trồng vụ tiếp theo. Trong tuần,

			các đối tượng gây hại trên cây lúa chủ yếu: chuột, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt phát sinh gây hại trên các diện tích lúa Mùa chưa thu hoạch.
Cây ngô	Hè thu	Chín – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 21.6mm. Mưa nhỏ giúp cho công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm diễn ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng do mưa nhỏ nên nhu cầu về nước của cây ngô không được bảo đảm (đặc biệt là với các diện tích ngô vụ Đông). Do đó, để bảo đảm cho sinh trưởng của cây ngô trong điều kiện thời tiết như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Bên cạnh đó, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu xám, sâu keo mùa thu, sâu cuốn lá, châu chấu tre lưng vàng.
	Đông	Gieo trồng – mọc mầm - 8 lá – xoáy nõn	
Cây lạc	Hè thu	Chắc củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn chắc củ - thu hoạch. Thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lạc củ đã già nên cần tranh thủ thời tiết để tập trung thu hoạch nốt các diện tích lạc còn lại. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần không đáng kể do phần nhiều các diện tích lạc đã cho thu hoạch.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	So với tuần trước, tuần này khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 2.9°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực có xu thế giảm không đáng kể so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 21.6mm, giảm 6.6mm so với tuần trước). Trong điều kiện thời tiết có mưa tương đối thấp, để bảo đảm cho cây sắn sinh trưởng tốt hơn, ở những nơi điều

			<p>kiện thủy lợi cho phép, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn. Trong tuần, cây sắn chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, bộ phận trắng, rệp sáp...</p>
Cây ăn quả có múi	Cam	Phát triển quả - quả xanh – quả chín	<p>Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 19.1-22.6°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 21.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích cây ăn quả có múi đã cho thu hoạch. Đối với các diện tích cây ăn quả có múi còn lại, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: nhóm nhện, ruồi đục quả, ngài mắt đỏ, bệnh loét, bệnh sẹo...</p>
	Bưởi	Quả xanh – chín – thu hoạch	
Cây vải		Phát triển lộc	<p>Cây vải trong khu vực Việt Bắc trong tuần tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 21.6mm. Trong điều kiện lượng mưa tương đối thấp, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây vải để đảm bảo cho cây vải sinh trưởng khỏe mạnh cũng như giúp cho đợt lộc thu cuối cùng trên cây vải bật lộc toàn bộ. Trong tuần, cây vải chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đo ăn lộc non, sâu đục thân, bệnh thán thư... cần chú ý theo dõi và chủ động phun thuốc phòng trừ khi thấy mật độ cũng như mức độ gây hại vượt ngưỡng cho phép.</p>
Cây chè		Ra búp – hái tận thu	<p>Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần này của khu vực tương đối thấp dẫn đến tốc độ phát triển búp trên cây chè chậm lại, làm sụt giảm năng suất chè thu hoạch được. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè trong tuần chủ yếu:</p>

			sâu đục thân, bệnh phòng lá thối búp, bọ cánh tơ, rầy xanh...
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.0-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5-24.5°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc có xu thế tăng, lượng mưa không đáng kể. Trong tuần tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tiếp tục thu hoạch các diện tích cây trồng có thể cho thu hoạch; Trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa, cần chú ý bảo đảm đủ nước cho các loại cây trồng còn lại để bảo đảm cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sâu bệnh hại; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng