



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tuần 1 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 19.1 - 27.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.4°C, tổng lượng mưa là 23.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 163.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 13-15/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 16-19/11, có mưa rào vài nơi. Từ ngày 20-21/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. (Nguồn: TT DB KTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 27.4 | 21.4 | 24.4 | 186.8 |
| Trong tuần | 27.8 | 19.1 | 23.4 | 23.6 |
| Tuần tới | 27.0-30.0 | 18.0-21.0 | 22.5-25.5 | 20.0-40.0 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|-----------|--------|-----------------------|---|
| Cây mía | | Tích lũy đường | Đối với giai đoạn tích lũy đường, nhiệt độ tốt nhất trong khoảng từ 28-35°C. Theo thống kê từ bảng 1 có thể nhận thấy điều kiện thời tiết chưa phải là tốt nhất cho mía sinh trưởng và phát triển trong tuần này. Lưu ý một số sâu bệnh chủ yếu như: bọ phấn trắng, bệnh căn mía gốc, sâu đục thân mía. Thường xuyên thăm ruộng mía, bón phân đầy đủ, chăm sóc làm cỏ kịp thời, nếu phát hiện cây bị bệnh phải chặt gom ra khỏi ruộng, đốt chôn vùi sâu không để lây lan. |
| Cây lạc | Đông | Ra hoa – đằm tia | Lượng mưa trong tuần tương đối ít, trong thời kỳ lạc ra hoa cần bổ sung nước cho lạc theo 2 cách sau: Tưới phun đều ruộng lạc, ướm thấm đất; tháo nước đầy các rãnh, ngập hết mặt luống thì tháo nước ra. |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------|--------|--|---|
| | | | Lưu ý sâu xám, sâu cuốn lá, sâu khoang phát sinh gây hại trên các ruộng lạc; rệp tập trung thành đám bám vào phần lá non, đọt non của lạc chích hút dịch cây làm lạc sinh trưởng kém, quả queo, ra hoa đậm tia kém. |
| Cây sắn | | Tích lũy bột – thu hoạch | Thời kỳ tích lũy tinh bột sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng. Thống kê từ bản 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải là thuận lợi nhất cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp bột hồng, sùng trắng, bệnh khảm vi-rút gây hại trên cây sắn; thường xuyên theo dõi đồng ruộng, khi phát hiện bệnh cần tiến hành tiêu hủy cây bị bệnh triệt để theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. Tạo vườn sắn thông thoáng, bón phân đầy đủ ,cân đối. |
| Cây ngô | Đông | 5 lá – xoáy nõn | Ngô phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 24 - 30°C; nhiệt độ trên 38°C ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Theo thống kê từ bảng 1 có thể nhận thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, đốm lá, bệnh phấn đen sâu xám, sâu đục thân và đục bắp, rệp cờ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương phun thuốc trừ sâu thích hợp. |
| Rau màu | | Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch | Bệnh héo xanh phát sinh gây hại trên các cây họ cà (cà chua, cà tím, ớt) và họ bầu bí (dưa leo, khổ qua, bầu bí, mướp). Bệnh lở cổ rễ hại trên rau màu ở giai đoạn cây con trên các loại rau như bầu, bí, dưa leo, khổ qua, dưa hấu, cà chua. Bệnh phát sinh phá hại từ khi cây mới mọc đến khi cây có 1-2 lá. |
| Cây ăn quả | | KTCB – chín – thu hoạch – chăm sóc | Thời tiết chuyển đông thường xuyên có sương mù, người dân cần thu hoạch quả những ngày nắng ráo. Tránh việc thu hoạch sau khi mưa xuống hoặc lúc có sương mù dày đặc vì rất dễ khiến trái cây bị ẩm thối. Cần lưu ý: Bệnh vàng lá thối rễ phát sinh gây hại tăng tại các vùng chuyên canh; bệnh Greening, bệnh thán thư tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Các khuyến cáo, lưu ý |
|------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | bộ hại nặng. Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa phát sinh và gây hại tăng; |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 27.0 – 30.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 18.0 – 21.0°C nhiệt độ không khí trung bình 22.5 – 25.5°C, tổng lượng mưa là 20.0 – 40.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng