


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 11 năm 2022


### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 19.0-24.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 69.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 69.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 23.0$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 6.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21 đến ngày 23/11 và từ 26/11-01/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 23-25/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 24/11 khu đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	17.1	21.2	0.8
Trong tuần	24.8	19.0	21.9	69.9
Tuần tới	27.0-30.0	21.0-24.0	24.0-27.0	40.0-80.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây vải		Phát triển lộc – lộc bánh tẻ	Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 21.9°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 69.9mm. Trong tuần, cây vải tiếp tục trong thời kỳ kim hãm sự bật lộc đông (đây là việc hết sức quan trọng quyết định đến thắng lợi của vụ vải năm tiếp theo nên cần đặc biệt lưu ý), do đó, trong thời gian này, người dân cần tiếp tục chú ý các biện pháp giúp kim hãm sự phát triển của lộc đông trên cây vải như: xiết nước, khoanh cành, chặt bớt phần rễ ăn lan xung quanh gốc cây; thường xuyên kiểm tra vườn vải, nếu phát hiện ra những mầm đông mọc sớm đối với các vườn vải lộc đông ra ít có thể dùng tay hoặc kéo để ngắt lộc đông (lưu ý ngắt sát gốc mầm), đối với những vườn vải lộc đông ra nhiều có thể dùng thuốc trừ cỏ như Ronstar 25 EC để phun diệt lộc ngay (lưu ý sử dụng đúng với hướng dẫn trên bao bì của

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			nhà sản xuất). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải trong tuần cần chú ý: sâu đục thân, sâu đục gân lá, sâu đo ăn lộc non, sâu cuốn tổ, bệnh đốm nâu...
Cây ăn quả có múi		Quả xanh - quả chín - thu hoạch	So với tuần trước, tuần này khu vực Đông Bắc có lượng mưa tăng đáng kể (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 69.9mm). Mặc dù có mưa, nhưng lượng mưa trong tuần không nhiều cùng với việc nhiều tuần trước đó lượng mưa của khu vực rất thấp nên đã khiến cho cây ăn quả có múi thiếu nước gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cũng như chất lượng quả có múi thành phẩm. Vì vậy, trong tuần này người dân vẫn cần lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi; đối với các diện tích quả có múi đã chín, cần tập trung thu hoạch tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong tuần, cây ăn quả có múi tiếp tục chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu đục quả, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo, râm quả....
Cây ngô	Đông	4-6 lá – xoáy nõn – trổ cờ - phát triển bắp	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (với mức biến động của nhiệt độ không khí trung bình 0.7°C), tổng lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 69.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá thuận lợi cho việc trổ cờ - tung phấn – thụ tinh trên cây ngô diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để cho cây ngô sinh trưởng tốt hơn, người dân cần chú ý tưới thêm nước kết hợp bón thúc, làm cỏ và vun cao luống để tránh tình trạng cây ngô bị đổ ngã. Sâu keo mùa thu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đốm lá, rệp hại là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Cây lạc	Đông	Cây con – phân cành	Cây lạc trong khu vực Đông Bắc hiện đang trong giai đoạn cây con – phân cành. Trong giai đoạn này, cây lạc cần đầy đủ độ ẩm để sinh trưởng. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 19.0-24.8°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 69.9mm. Trong điều kiện thời tiết se lạnh và lượng mưa ở mức trung bình, cây lạc sinh trưởng chậm. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý công tác làm cỏ, xới đất nhẹ (lưu ý không

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			vun gốc để cây lạc phân cành thuận lợi), tưới nước kết hợp bón phân hợp lý để giúp cây lạc sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như các đối tượng sâu bệnh hại. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần cần chú ý: sâu xám, sâu xanh ăn lá, rệp hại, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ...
Cây rau màu	Đông	Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch	Từ nhiều tuần gần đây, khu vực Đông Bắc liên tục có lượng mưa tương đối thấp (thậm chí là không có mưa) đã khiến cho cây rau màu trong khu vực sinh trưởng và phát triển kém cũng như chất lượng của cây rau thành phẩm không được bảo đảm. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây rau màu, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 69.9mm, tại các khu vực thiếu nước, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây rau màu. Trong tuần, cây rau màu tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng gây hại: sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy, rầy mềm...
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Tuần 2 tháng 11, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 21.9°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 69.9mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây sắn trong khu vực Đông Bắc sinh trưởng và phát triển bình thường. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn trong tuần: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại (nhất là đối tượng bệnh khảm lá sắn do virus) khi phát hiện các diện tích nhiễm cần tiến hành thu gom tiêu hủy để tránh sự lây lan trên diện rộng của các đối tượng này làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây sắn cũng như để giúp bảo đảm được nguồn sản giống khỏe mạnh cho vụ gieo trồng tiếp theo.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 21.0-30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.0-27.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-80.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ cơ bản phù hợp với sinh trưởng của các loại cây trồng, tuy nhiên lượng mưa dự báo của khu ở mức trung bình. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần chú ý: Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng (nhất là đối với các cây trồng vụ đông như: ngô, lạc, cây rau màu các loại),

riêng đối với cây vải, cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để tiến hành thu hoạch các vườn cây ăn quả có múi đã chín; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, làm cỏ, bón phân cân đối và hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu trước điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sự ảnh hưởng của các đối tượng sâu bệnh hại; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**