



Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 1 tháng 12 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 138.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 62$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 180.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.0	18.7	22.3	52.4
Trong tuần	27.0	18.8	22.9	190.6
Tuần tới	28.0 - 31.0	17.0 - 20.0	22.5 - 25.5	5.0 - 15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 1 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Thu Đông (Đắc Lắc)	Đòng trổ - chín	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm. Nhiệt độ thích hợp nhất đối với giai đoạn mạ là 30 - 35°C. Thời kỳ đẻ nhánh nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 25-32°C. Do đó, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho cây lúa ở các giai đoạn này. Cần lưu ý một số sinh vật gây hại như: Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ lá, cỏ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt phát sinh gây hại trên lúa Mùa và lúa Thu Đông giai đoạn trổ - chắc xanh. Trên cánh đồng đã thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế nguồn bệnh, tàn dư sau thu hoạch.
	Mùa chính vụ	Trổ - chín - thu hoạch	
	Đông Xuân trà sớm	Mạ - đẻ nhánh	
Ngô	Vụ mùa 2022	Trổ cờ - phun râu - thu hoạch	Đối với giai đoạn cây con 20 - 30°C. Trong giai đoạn trổ cờ - phun râu nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25-28°C, đây là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất ngô. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm tương đối phù

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
	Đông Xuân 2022-2023	Cây con	hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; đối với giai đoạn cây con nếu mưa gây ngập úng cần có biện pháp thoát nước kịp thời, tuyệt đối không để cây con bị ngập úng, ngoài ra cần chú ý một số bệnh phổ biến như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai, sâu keo mùa thu.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - Thu hoạch	Tổng hợp tại bảng 1 cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm. Trong thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Do đó có thể thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn đối với các giai đoạn này. Trong tuần rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá virus hại sắn tiếp tục phát sinh và gây hại; người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại và tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cho sắn hiệu quả, tránh để lây lan diện rộng.
	Hè Thu 2022	PTTL - nuôi củ- thu hoạch	
	Mùa 2022	Phát triển thân lá	
	ĐX 2022-2023	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Rau màu đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15 độ C đến 40 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.8 – 27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm. Cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau sấu xanh, sâu cuốn lá.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Sầu riêng sau khi thu hoạch sẽ cần được cung cấp dinh dưỡng để phục hồi, vệ sinh vườn, cắt bỏ và tiêu hủy những cành già, lá già nhiễm bệnh, cành không có khả năng cho trái, để tạo thông thoáng vườn cây. Theo thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Cần lưu ý bổ sung dinh dưỡng cho cây như sử dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh đồng thời chủ động biện pháp phòng, chống các đối tượng SVGH như bệnh nứt, thân xì mù.
Cà phê		Thu hoạch	Thống kê tại bảng 1 nhiệt độ dao động từ 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			<p>lượng mưa là 190.6mm. Đối với cà phê chè nhiệt độ thích hợp từ 18– 25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Qua đó có thể thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển ở các giai đoạn này. Cần tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch cà phê. Trong tuần rệp sáp, rệp vảy hại tăng; bệnh thán thư tiếp tục hại. Bọ xít muỗi gây hại chủ yếu trên cây cà phê chè ở Lâm Đồng. Bệnh khô cành, rệp các loại trên cây cà phê tiếp tục gây hại trên các vườn cây, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém. Bệnh gỉ sắt phát sinh gây hại trên các vườn cây chưa được phòng trừ.</p>
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	<p>Hồ tiêu đang trong thời kỳ nuôi quả - chắc quả, Trong giai đoạn này cần tạo độ ẩm cho gốc bằng những rặng lá đã tía xuống hoặc làm những thảm cỏ che phủ gốc giữ ẩm cho cây. Khi cỏ quá cao, có thể phát bót còn khoảng 15 – 20 cm và không nên phát trực hoặc để trồng trong giai đoạn này. Cần cắt bỏ bót những cành vô hiệu, không có trái để những cành còn lại quang hợp tốt nhất. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu ở các giai đoạn của tuần này. Cần lưu ý một số sinh vật gây hại như: rệp muội, rệp bông, bọ xít, nhện đỏ ảnh hưởng đến năng suất của vườn tiêu. Khi phát hiện có bệnh có thể ưu tiên phun thuốc cục bộ, hạn chế tối đa phun toàn vườn, sử dụng các loại thuốc an toàn trong danh mục cho phép.</p>
Điều		Chăm sóc – thay lá, ra đọt non, ra hoa	<p>Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.8 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 190.6mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở giai đoạn này. Trong tuần bọ xít muỗi gây hại tăng trên các vườn trồng điều; sâu đục rệp lá, sâu đục thân, bệnh khô cành, bệnh thán thư gây hại điều giai đoạn chăm sóc - thay lá, ra đọt non. Lưu ý thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình và hiệu quả.</p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 28.0 – 31.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 17.0 – 20.0°C nhiệt độ không khí trung bình 22.5 – 25.5°C, tổng lượng mưa là 5.0 – 15.0 mm, do đó, có

thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có sự dao động nhiệt độ ngày đêm tương đối lớn, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**