



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 10.9 - 15.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.2°C, tổng lượng mưa là 31.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 24.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 8.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 21.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.7\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 31/12/2022- 10/01/2023, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng các ngày 04-05/01 trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.0	9.6	12.8	6.9
Trong tuần	15.6	10.9	13.2	31.2
Tuần tới	15.0-18.0	10.0-13.0	12.5-15.5	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Chiêm xuân	Mạ, 1-3 lá	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng $10.9-15.6^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 31.2mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với thời tiết gần như không có mưa đã khiến cho cây mạ chiêm xuân đã xuống giống sinh trưởng kém. Trong điều kiện thời tiết như trên, công tác giữ ấm, phòng rét và bảo đảm đủ ẩm cho cây mạ. Người dân có thể nên sử dụng nilong, tro bếp để phủ lên trên luống mạ nhằm giữ ấm cho cây mạ, trong những ngày thời tiết ấm lên cần mở khung nilong để giúp cho cây mạ hô hấp dễ dàng. Đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời giảm thấp dưới 13.0°C , tuyệt đối không tiến hành gieo mạ để tránh tình trạng mạ bị chết do rét. Trong giai đoạn này, một số đối tượng gây hại chủ yếu trên lúa chiêm xuân cần chú ý: ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng hại rễ ... trong quá trình chăm sóc, cần chú ý

			theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
Cây ngô	Đông	Thâm râu – thu hoạch	Trong tuần này, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 13.2°C, tổng lượng mưa đạt 31.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực khá phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích ngô Đông đã già. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích ngô có thể cho thu hoạch để tiến hành dọn dẹp vệ sinh lại ruộng, giải phóng đất để chuẩn bị gieo trồng vụ Xuân 2023. Các đối tượng sâu bệnh tiếp tục gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn ...
Cây lạc	Đông	Chắc củ - thu hoạch	Cây lạc trong khu vực Việt Bắc trong tuần này trong các giai đoạn chắc củ - thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 31.2mm. Trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa, việc thu hoạch các diện tích lạc Đông đã già diễn ra thuận lợi nên người dân cần tranh thủ thời tiết tốt để tập trung thu hoạch các diện tích lạc củ có thể cho thu hoạch. Sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh lại đồng ruộng nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng sâu bệnh sang vụ sau, chuẩn bị đất để gieo trồng vụ Xuân sắp tới. Trong tuần, do phần nhiều các diện tích lạc đã cho thu hoạch nên ảnh hưởng của của sâu bệnh lên cây lạc không đáng kể.
Cây đậu tương		Chắc quả - thu hoạch	Tương tự như với cây ngô và cây lạc, trong tuần này, thời tiết của khu vực Việt Bắc tương đối phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích đậu tương đã già cũng như công tác dọn dẹp và vệ sinh lại đồng ruộng sau thu hoạch nhằm giải phóng ruộng đất để chuẩn bị cho vụ Xuân sắp tới cũng như tiêu trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại còn sót lại để tránh tình trạng lây lan sang vụ tiếp theo.
Cây sắn		Thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 10.9-15.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 31.2mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh và mưa không đáng kể, việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã già trên cây sắn diễn ra thuận lợi. Do đó, người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết

			thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích sẵn củ đã có thể cho thu hoạch. Sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp lại đồng ruộng, tiến hành thu gom và tiêu hủy toàn bộ phế phẩm còn lại của cây sắn cũng như cỏ cũ còn lại trong ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây sắn.
Cây ăn quả có múi	Cam, quýt	Quả già, chín - thu hoạch	Trong tuần này, các loại cây ăn quả có múi trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong các giai đoạn quả già – chín – thu hoạch. Từ nhiều tuần nay, khu vực Việt Bắc liên tục có lượng mưa rất thấp (thậm chí nhiều nơi không có mưa). Trong tuần này, khu vực Việt Bắc tiếp tục có lượng mưa không đáng kể giúp cho việc thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết trong tuần tương đối lạnh, nhiều nơi nhiệt độ xuống thấp đến mức rét đậm – rét hại cùng với lượng mưa không đáng kể khiến cho cây ăn quả có múi sinh trưởng kém nên cần chú ý tưới đủ nước cho cây. Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, cần có các biện pháp để chống rét cho cây ăn quả có múi: sử dụng rơm rạ, cỏ khô để tủ xung quanh gốc nhằm giữ ấm cho cây đồng thời hạn chế sự bốc thoát hơi nước và ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục quả, sâu đục thân cành, bệnh ghẻ sẹo ...
	Bưởi	Quả chín – thu hoạch	
Cây vải		Phát triển lộc	Tuần 3 tháng 12, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 13.2°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 31.2mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tiếp tục thuận lợi cho việc kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây vải. Mặc dù thời tiết từ nhiều tuần nay chủ đạo là lạnh và khô giúp cho cây vải hãm lộc tốt, tuy nhiên người dân vẫn cần thường xuyên kiểm tra vườn vải để kịp thời phát hiện những mầm đông mọc sớm để tiến hành ngắt bỏ kịp thời; ngoài ra, trong giai đoạn này cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải: sâu đục gân lá, sâu ăn lộc non, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư, bệnh sương mai ... khi phát hiện mật độ gây hại vượt quá mức cho phép cần chủ động phun thuốc để diệt trừ kịp thời.

Cây chè		Đón cành	Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường khiến cho nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tiếp tục ở mức thấp. Lượng mưa trong tuần đạt 31.2mm. Trong tuần, cây chè tiếp tục trong giai đoạn đón, có thể nhận thấy thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho công tác đón chè trong khu vực. Trong khi đón cần lựa chọn phương pháp đón chè phù hợp cho từng diện tích chè. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè: sâu đục thân/cành, bệnh sùi cành, bọ xít ...
---------	--	----------	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0-18.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.5-15.5°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa dự báo tuần tới của khu vực không đáng kể. Do đó, trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích cây trồng vụ Đông có thể cho thu hoạch, sau thu hoạch cần tiến hành dọn dẹp vệ sinh lại đồng ruộng để chuẩn bị gieo trồng vụ Đông xuân 2022-2023; Chủ động nguồn nước để tiếp tục tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng, riêng đối với cây vải cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng