



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 2 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 10.3 - 13.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 129.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 4.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 12.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 107.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 27.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 119.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ 27/02 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét; riêng 23/02, trời rét đậm; ngày 24-25/02 có nơi rét đậm. Từ ngày 01-02/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	13.8	8.8	11.3	21.4
Trong tuần	13.0	10.3	11.6	129.1
Tuần tới	24.0-27.0	7.0-10.0	15.5-18.5	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa cấy	Đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 10.3 - 13.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 129.1mm. Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 10.3 - 13.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 129.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu có hiệu quả cao.
Cây ăn quả		Thu hoạch - phát triển	Số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 10.3 - 13.0°C, nhiệt độ

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
		lộc	không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 129.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Xuân	Ba lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 7.0-10.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Cây lạc xuân	Xuân	Cây con - 3 lá	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 10.3 - 13.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 129.1mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo quy định.
Cây khoai tây		Cây con	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 7.0-10.0°C; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, héo muện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần kịp thời áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 7.0-10.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tiếp tục thấp với nhiệt độ tối thấp trong khoảng 7.0-10.0 độ C, cây trồng cần tăng cường các biện pháp chống rét như: Đối với rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch dứt điểm; tưới nước đủ ẩm cho cây trồng trong những ngày rét đậm, rét hại, đồng thời áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**  
**KIỂM SOÁT**

**Quách Thị Thanh Tuyết**  
**Phạm Thị Kim Phụng**