



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 2 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 23.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 3.1$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 3.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-14/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sang ngày 13/02 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 13/02, trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 15 đến ngày 20/02, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng thời kỳ ngày 17-18/02 trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét, riêng ngày 17-18/2 đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.1	15.7	17.9	42.7
Trong tuần	16.7	13.7	15.2	18.9
Tuần tới	21.0-24.0	11.0-14.0	16.0-19.0	10.0-30.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa sạ	3 lá - đẻ nhánh	Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-30 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả, thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-30.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
Cây ngô	Đông	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Nhãn		Phát triển lộc	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp.
Cây chè		Đón - chăm sóc	Theo thống kê nhiệt độ trong tuần dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc sâu theo hướng dẫn.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-30.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh, tránh lây lan sang diện tích khác.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.
Cà chua		Hoa - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 13.7 - 16.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.2°C, tổng lượng mưa là 18.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh héo xanh, ruồi đục lá; khi phát hiện sâu bệnh có thể sử dụng vôi bột rải vào đất hoặc thuốc trừ sâu cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tiếp tục thấp, do đó, cây trồng cần được chú ý biện pháp chống rét hiệu quả như sử dụng lưới hoặc nilon trắng che phủ lên trên bề mặt và xung quanh luống rau để tránh mưa rét và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**