



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 9.1 – 17.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.0°C, tổng lượng mưa là 10.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 72mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 19.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/3, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 02-06/3 và từ ngày 08-11/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 06-07/03, có mưa rào và rải rác có dông. Trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.3	12.5	15.9	82.7
Trong tuần	17.0	9.1	13.0	10.7
Tuần tới	24.0-27.0	15.0-18.0	19.5-22.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Lúa cây (cây - hồi xanh - đẻ nhánh) Lúa sạ (hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ)	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực giảm đáng kể so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 2.9°C); lượng mưa trong tuần này của khu vực giảm mạnh so với tuần trước (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 10.7mm, giảm 72.0mm so với tuần trước). Trong điều kiện thời tiết lạnh và mưa gần như không đáng kể, người dân cần chú ý: luôn giữ mực nước trong ruộng khoảng 3 cm để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lúa cũng như giúp giữ ẩm chân gốc cho cây lúa; ngoài ra cần chú ý tía dặm lại trên những diện tích lúa bị chết do rét hại gây ra để bảo đảm mật độ cây lúa trên ruộng, kết hợp bón phân, làm cỏ sục bùn, chủ động theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa (bệnh đạo ôn, bệnh

			vàng lá sinh lý, rầy các loại...) để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Cây ngô	Xuân 2022	Gieo trồng – 7 lá	Tuần 3 tháng 2, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ rất thấp (nhiệt độ thấp nhất đạt 9.1°C), đây là điều kiện bất lợi đối với sinh trưởng của cây ngô (đặc biệt là những diện tích ngô mới gieo trồng, nhiệt độ thấp khiến cho quá trình nảy mầm ở cây ngô bị ngừng trệ), hơn nữa trong tuần lượng mưa của khu vực chỉ đạt 10.7mm khiến cho cây ngô rơi vào tình trạng thiếu nước nếu không được tưới bổ sung kịp thời. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá. Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý: không gieo trồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – 4 lá - phân cành	Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần tiếp tục giảm sâu, với mức nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 13.0°C; lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 10.7mm. Điều kiện thời tiết rét hại và mưa ít khiến cho cây lạc sinh trưởng kém (một số diện tích lạc bị chết do rét hại và thiếu nước). Để bảo đảm cho cây lạc sinh trưởng tốt hơn, người dân cần chú ý: tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng nhu cầu của cây; ngoài ra cần bảo đảm giữ ẩm cho cây lạc (dùng rơm rạ phủ lên trên luống mạ, tránh bón phân Đạm, bón thêm phân Lân và Kali để giúp cây tăng khả năng chịu rét). Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi các đối tượng: sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh thối thân...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển lộc – ra hoa	Cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 23.0-29.0°C, dưới 13.0°C cây ngừng phát triển. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tương đối thấp khiến cho cây ăn quả có múi sinh trưởng kém. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển lộc – ra hoa, cây ăn quả có múi cần nhiều nước; tuy nhiên lượng mưa thấp không bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu cho cây trong giai đoạn này. Vì vậy, người dân cần chủ động bổ sung nước cho cây. Ngoài ra, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây: sâu đục thân, sâu vẽ bùa, rầy chống cánh... để

			có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Trong mùa nở hoa, nhiệt độ thích hợp cho cây nhãn từ 25.0-31.0°C. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 9.1-17.0°C, lượng mưa trong tuần này rất thấp (10.7mm). Nhiệt độ và lượng mưa thấp là điều kiện bất lợi cho sinh trưởng của cây nhãn trong tuần. Do đó, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây nhãn, chú ý cần tưới nhiều lần, tưới đủ ẩm, tránh tưới quá nhiều nước sẽ làm ảnh hưởng đến hô hấp của rễ cây. Bên cạnh việc tưới nước giữ ẩm cho cây cần chú ý đến việc bón phân cho cây nhãn. Các đối tượng sâu bệnh hại trên cây nhãn cần đặc biệt lưu ý lúc này: bọ xít, sâu đục nụ hoa. Khi phát hiện cần lập tức phun phòng trừ để tránh làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 13.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 10.7mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần không phù hợp với sinh trưởng của cây chè (cây chè sinh trưởng kém ảnh hưởng đến tốc độ phát triển búp kéo theo năng suất chè thu hoạch được bị sụt giảm). Bọ xít muỗi là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần. Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tưới nước kết hợp bón phân bổ sung để giúp cây chè sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết và sâu bệnh hại.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.0 – 27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.5-22.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa có xu thế tăng tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Các cây trồng cần tiếp tục được chú ý chăm sóc giúp cây trồng nhanh chóng phục hồi sau thời gian rét đậm rét hại; chủ động nguồn nước để phân bổ cho từng loại cây trồng theo nhu cầu, bảo đảm cây trồng không bị thiếu nước; kết hợp bón phân để thúc cho cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết cũng như các đối tượng gây hại; ngoài ra cần theo dõi chặt chẽ biến biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng