



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 16.3 - 20.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 41.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 16.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 13.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 11.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-06/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 06-08/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Bắc ngày 08/3 có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 09-12/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.3	17.9	20.6	25.2
Trong tuần	20.5	16.3	18.4	41.9
Tuần tới	26.0-29.0	19.0-22.0	22.5-25.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Cây - đẻ nhánh - đứng cái - trổ	Nhiệt độ thích hợp cho cây lúa trong các giai đoạn này từ $25.0-32.0^{\circ}\text{C}$. Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng $16.3-20.5^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 41.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần không thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây lúa theo từng giai đoạn. Giai đoạn cây con - bắt đầu đẻ nhánh cần duy trì mực nước trong ruộng từ 1-3cm. Trong suốt giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, nên áp dụng biện pháp tưới nước "Uớt - khô xen kẽ", trong giai đoạn này giữa các đợt lấy nước cần kết hợp bón phân để thúc cho cây lúa đẻ nhánh khỏe và tăng nhánh hữu hiệu. Từ giai đoạn đứng cái - trổ, nên duy trì

			mực nước trong ruộng khoảng 5cm để giúp cây lúa phát triển tốt nhất. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc brou vàng, bệnh đạo ôn lá, tuyến trùng, bọ trĩ...
Cây ngô	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá - trổ cờ	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong các giai đoạn cây con - trổ cờ. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực tiếp tục là điều kiện không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Bên cạnh tác động không tốt từ thời tiết, trong tuần, cây ngô còn chịu ảnh hưởng bởi các đối tượng sâu bệnh hại: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh khô vằn... Trong quá trình chăm sóc, ngoài việc chú ý diễn biến sâu bệnh hại để kịp thời phòng trừ, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng tốt nhất.
Cây lạc	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá – ra hoa – đâm tia	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 18.4°C, lượng mưa của khu vực đạt 41.9mm. Nhiệt độ và lượng mưa trong tuần tương đối thấp khiến cho cây lạc sinh trưởng kém, đặc biệt ảnh hưởng đến việc ra hoa và đâm tia ở cây lạc. Để bảo đảm cho cây lạc sinh trưởng tốt nhất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, người dân cần tưới thêm nước để bảo đảm nhu cầu nước cho cây lạc, tiến hành xới xáo giúp đất thông thoáng, làm cỏ để tránh cho cỏ dại hút hết chất dinh dưỡng khi bón phân. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại cây lạc trong tuần cần chú ý: bệnh héo rũ, bệnh đốm lá, sâu ăn lá...
Cây sắn		Mọc mầm – cây con – phát triển thân lá	Tuần 3 tháng 2, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, lượng mưa tăng so với tuần trước tuy nhiên thời tiết trong tuần này của khu vực cơ bản không thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn, ngoài ra cần chú ý theo dõi diễn biến bệnh khảm lá sắn do virus trên cây sắn.
Cây ăn quả có		Thu hoạch – chăm sóc sau	Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch nốt các diện tích quả còn

múi		thu hoạch	sốt lại, đồng thời chăm sóc các diện tích đã cho thu hoạch. Thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ trong tuần cơ bản khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả còn lại cũng như công tác vệ sinh lại vườn sau thu hoạch. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần không đáng kể, chủ yếu là đối tượng sâu đục thân/cành đã tồn tại lâu trên cây.
Cây cao su		Thu hoạch - kiến thiết cơ bản	Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực giảm đáng kể so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 2.2°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực tăng 16.7mm so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 41.9mm). Trong điều kiện thời nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây cao su sinh trưởng kém. Do đó, người dân cần chủ động tưới thêm nước kết hợp bón phân bổ sung cho cây; ngoài ra cần chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây cao su: bệnh xì mủ, bệnh rụng lá đốm tròn...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 19.0 – 29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5-25.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm. Các cây trồng cần trong tuần tới cần được chú ý: chủ động nguồn nước để bảo đảm cung cấp đủ cho từng loại cây theo nhu cầu, tiến hành bón phân cân đối và hợp lý, ngoài ra cần tăng cường theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng