



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 1 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 10.5 - 15.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.9°C, tổng lượng mưa là 36.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 7.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 8.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 18.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-11/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 12-14/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 14/02 có mưa vài nơi. Ngày 12/02, đêm và sáng trời rét; ngày 13-14/02, trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 15-20/02, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác (tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn), trưa chiều trời nắng; riêng đêm 18-19/02 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTT Quốc Gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.3	13.0	15.1	44.2
Trong tuần	15.3	10.5	12.9	36.3
Tuần tới	22.0-25.0	10.0-13.0	16.0-19.0	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Mạ chiêm xuân sớm (gieo - nhổ cấy) Lúa chiêm xuân (Gieo - cấy - hồi xanh - đẻ nhánh)	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 10.5-15.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 36.3mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh và mưa nhỏ, cây lúa sinh trưởng rất kém. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý: đối với các diện tích lúa đã cấy cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 2-3cm kết hợp bón thêm tro bép và lân (tuyệt đối không bón đạm và NPK trong thời điểm này) để giữ ấm chân cho cây lúa cũng như tăng khả năng chống rét cho cây lúa, tuyệt đối không gieo cấy trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C (các

			diện tích mạ đã đạt tuổi cây cần chờ thời tiết ấm lại mới tiến hành cấy). Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc bươu vàng, tuyến trùng hại rễ, bệnh nghệt rễ...
Cây ngô	Đông 2021	Phát triển bắp – thu hoạch	Tuần 1 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tiếp tục bổ sung khiến cho khu vực Việt Bắc rét đậm rét hại, nên nhiệt độ rất thấp gây ảnh hưởng xấu tới sinh trưởng của cây ngô (nhất là các diện tích ngô mới trồng). Trong tuần, mặc dù có mưa tuy nhiên lượng mưa trong tuần chỉ đạt 36.3mm, không đủ đáp ứng nhu cầu của cây ngô. Sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: bệnh vàng lá, sâu xám, sâu đục bắp... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý: thu hoạch các diện tích ngô đã già để chuẩn bị đất trồng cho vụ tiếp theo cũng như tránh bị thiệt hại do trời rét, các diện tích ngô còn lại cần chủ động bổ sung thêm nước kết hợp bón thêm phân Lân và Kali để bảo đảm cây ngô phát triển khỏe mạnh cũng như giữ ấm và tăng khả năng chống chịu với trời rét cho cây (riêng với các diện tích ngô xuân mới trồng, cần xới xáo để đất thông thoáng giúp cây dễ dàng hô hấp và phát triển bộ rễ).
	Xuân 2022	Mới trồng – 2 lá	
Cây cà chua		Hoa - thu hoạch	Cây cà chua trong tuần tiếp tục trong các giai đoạn hoa – thu hoạch. Cũng tương tự như nhiều tuần nay, thời tiết trong tuần này của khu vực Việt Bắc không thuận lợi đối với sinh trưởng của cây cà chua gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng quả khi thu hoạch. Sâu xanh đục quả, ruồi đục lá, rầy mềm tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cà chua trong tuần. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý tỉa thưa cành nhánh để giúp làm thông thoáng và hạn chế sâu bệnh hại.
Cây sắn	Niên vụ 2021	Thu hoạch	Trong tuần này, cây sắn trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch. Tuần này, nhiệt độ trung bình của khu vực 12.9°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 36.3mm. Có thể nhận thấy thời tiết tuần này của khu vực tiếp tục phù hợp cho việc thu hoạch sắn củ đã đạt thành phẩm. Sau thu hoạch, người dân cần nhanh chóng dọn dẹp lại ruộng, thu gom và đốt bỏ toàn bộ cỏ dại cũng như phế phẩm còn lại của cây sắn, chuẩn bị nguồn giống khỏe mạnh để tiến hành gieo trồng vụ tiếp theo.
Cây ăn		Thu hoạch	Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục

quả có múi			trong những giai đoạn cuối của vụ thu hoạch. Lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Người dân cần nhanh chóng thu hoạch nốt số quả còn lại để chuyển sang giai đoạn chăm sóc giúp cây ăn quả nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch quả. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, sâu đục quả.
Cây vải		Phát triển lộc	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 10.5-15.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 36.3mm. Trong tuần này, cây vải tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc, tại một số vườn vải đã có những cây bắt đầu phát mầm hoa ở ngọn, khi mầm hoa dài trên 5cm cần kiểm tra và ngắt bỏ lá mọc kèm. Trong tuần, cây vải chịu tác động bởi một số đối tượng: nhện lông nhung, rệp muội, sâu đo....
Cây chè		Đón – chăm sóc	Tuần 1 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc rất thấp, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 36.3mm. Điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Trong tuần, cây chè tiếp tục trong giai đoạn đón – chăm sóc. Người dân cần tiếp tục công tác đón trên những diện tích chè chưa được đón. Những diện tích đã đón cần thu gom dọn dẹp những lại ruộng, bón bổ sung phân và phun thuốc để tiêu diệt mầm bệnh còn sót lại trên cây chè. Tiến hành xới xao, làm cỏ để tăng độ tơi xốp cho đất giúp cây chè phát triển tốt hơn.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0- 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.0-19.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-70.0mm. Do đó, có thể nhận thấy, trong tuần tiếp theo khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Một số lưu ý đối với các loại cây trồng trong tuần tiếp theo như sau: Đối với lúa cây, cần duy trì mực nước trong ruộng từ 2-3cm, bón phân hợp lý; chú ý các đối tượng: ốc bươu vàng, tuyến trùng hại rễ, bệnh nghệt rễ... tiếp tục phát sinh gây hại. Đối với cây mạ: sử dụng nilong để che phủ lên trên luống mạ để giúp giữ ẩm cho cây mạ, đối với cây mạ đã đạt tiêu chuẩn cấy cần chờ thời tiết ấm lại mới tiến hành cấy (tuyệt đối không cấy trong những ngày thời tiết xuống dưới 15°C). Đối với các cây trồng vụ Đông 2021 (ngô lạc, đậu tương, cà chua...): tiếp tục thu hoạch các diện tích đã đạt thành phẩm để hạn chế thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra; sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp ruộng và làm đất để tiến hành gieo trồng vụ

tiếp theo; Đối với các loại cây trồng còn lại, bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, cần chú ý bảo đảm nhu cầu về nước cũng như phân bón cho cây trồng, ngoài ra cần tiếp tục các biện pháp giúp giữ ẩm cho cây trồng trong những ngày trời rét.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng