



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 3 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 14.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 9.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 4.8\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 30.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5.0\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: từ ngày 10-15/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng ngày 14-15/03, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 16-20/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; riêng ngày 18/3 vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	13.8	8.0	10.9	5.1
Trong tuần	21.5	15.5	18.5	14.9
Tuần tới	21.0-24.0	10.0-13.0	15.5-18.5	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa cấy	Hồi xanh, đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ $15.5 - 21.5^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $18.5^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 14.9mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là độ $25-30^{\circ}\text{C}$ ; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ $15.5 - 21.5^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $18.5^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 14.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, sâu đục cuống quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh.
Cây ăn		Phát triển	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
quả		lộc - hoa	vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 14.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu bệnh hiệu quả cao.
Cây ngô	Xuân	5 lá - xoáy nõn	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 14.9mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp.
Cây rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho rau màu.
Cây lạc xuân	Xuân	4 lá - phân cành	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.5 - 21.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.5°C, tổng lượng mưa là 14.9mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có khăn trương diệt trừ sâu bệnh tránh lây lan ra diện tích rộng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 10.0-13.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm. Có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc nhiệt độ tối thấp dự báo vẫn dưới 15 độ C, lượng mưa thấp, do đó, cần tiếp tục các biện pháp chống rét phù hợp cho rau màu và lúa như tưới tăng cường dưỡng chất để tăng khả năng chống rét của cây trồng đồng thời diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**