



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 4 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 4 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 14.4 - 23.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.7°C, tổng lượng mưa là 17.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 10.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 66.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 77.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: ngày 11-12/4 do ảnh hưởng của rãnh gió Tây nên khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Khoảng ngày 16/4, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn đẩy dịch rãnh áp thấp xuống phía Nam gây mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày 17/4 sau giảm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc vào đêm và sáng. Đến khoảng ngày 20/4, do hội tụ mực 5000m nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh từ khoảng ngày 17/4, riêng ngày 18/4 có khả năng chuyển rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.6	18.5	22.5	84.7
Trong tuần	23.1	14.4	18.7	17.9
Tuần tới	32.0-35.0	16.0-19.0	24.0-27.0	80.0-110.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Hồi xanh - đẻ nhánh - đứng cái - phân hóa đòng - trổ	Tuần này, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực giảm đáng kể so với tuần trước. Cụ thể, nhiệt độ không khí trung bình tuần này giảm 4.2°C so với tuần trước (tuần trước nhiệt độ không khí trung bình đạt 22.5°C), lượng mưa tuần này của khu vực đạt 17.9mm (giảm 66.8mm so với tuần trước). Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây lúa sinh trưởng và phát triển chậm (khiến cho cây lúa đẻ nhánh kém, nghẽn đòng...). Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý điều tiết nước hợp lý cho cây lúa theo từng giai đoạn để bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng tốt nhất.

			Ngoài ra cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm...
Cây ngô	Xuân 2022	5 lá – xoáy nõn - trổ cờ	Cây ngô trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong các giai đoạn 5 lá - trổ cờ. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô, tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu cần thiết của cây ngô. Do đó, người dân cần chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ngô, tiến hành xới xáo ruộng đất kết hợp làm cỏ để giúp đất đai tơi xốp giúp cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô: sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, sâu đục thân, rệp hại cờ...
Cây lạc	Xuân 2022	5 lá – phân cành - đâm tia – phát triển củ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 14.4-23.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 17.9mm. Nhiệt độ và lượng mưa thấp khiến cho cây lạc sinh trưởng kém, gây sụt giảm số lượng hoa lạc và số tia hình thành quả. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt, sâu ăn lá... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc; ngoài ra, cần tiếp tục công tác xới xáo, làm cỏ, vun gốc để giúp đất đai tơi xốp, hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp hạn chế cỏ dại ăn hết chất dinh dưỡng và nước của cây lạc.
Cây khoai tây		Phát triển củ - thu hoạch	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực cơ bản rất thuận lợi cho việc hình thành và tích lũy tinh bột vào củ ở cây khoai tây. Lượng mưa trong tuần đạt 17.9mm là điều kiện rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích khoai tây đã đạt thành phẩm, tuy nhiên, đối với các diện tích khoai tây đang trong giai đoạn phát triển củ, người dân cần chú ý tưới thêm nước. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây khoai tây trong tuần: bệnh khảm lá, bệnh virus xoắn lùn, bệnh mốc sương...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt,		Phát triển lộc – ra hoa - quả non	Cây ăn quả có múi trong tuần tiếp tục trong các giai đoạn phát triển lộc – ra hoa - quả non. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp, có thể nhận thấy

bưởi)			điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước cho cây; ngoài ra có thể dùng rơm rạ, cỏ khô ủ quanh gốc để giúp giữ ẩm cho gốc cây, hạn chế sự bốc thoát hơi nước. Đồng thời, cần chú ý một số đối tượng gây hại trên cây ăn quả có múi: sâu non, rệp, nhện đỏ, bệnh thán thư...
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 17.9mm, đây là điều kiện khá thuận lợi cho cây nhãn ra hoa - đậu quả. Tuy nhiên, lượng mưa thấp khiến cho nhu cầu về nước của cây nhãn không được bảo đảm, do đó, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây. Trong giai đoạn này, cây nhãn cần đặc biệt được chú ý đến các đối tượng sâu bệnh gây hại: bọ xít nâu, bệnh sương mai...
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Tuần 1 tháng 4, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 14.4-23.1°C, nhiệt độ không khí trung bình đạt 18.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 17.9mm. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây chè sinh trưởng kém khiến cho tốc độ phát triển búp chậm lại gây ảnh hưởng đến năng suất búp chè thu hoạch được. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây chè. Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, sâu đục thân... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần cần chú ý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.0-27.0°C, tổng lượng mưa là 80.0-110.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng. Các cây trồng trong thời gian tới cần được chú ý: điều tiết nước hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng và tình hình thời tiết; tranh thủ thời tiết ấm lên cần tích cực chăm sóc, bón phân để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh, tạo tiền đề cho năng suất cao; tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**