



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 4 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 23.0 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 4.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.4^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.3^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 58.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 1.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: từ ngày 01/5 trời chuyển lạnh, đến ngày 02/5, giảm mưa xuống diện vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng dần và trời lạnh về đêm và sáng. Trong hai ngày 01-02/5 trên đa phần diện tích cả nước có mưa rào và dông diện rộng, có mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.8	20.7	23.3	62.8
Trong tuần	29.3	23.0	26.1	4.4
Tuần tới	28.0-31.0	19.0-22.0	23.5-26.5	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Trỗ - ngậm sữa	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 23.0 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 4.4mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 28-32 °C, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ phù hợp cho lúa phát triển. Tuy nhiên, trong tuần lượng mưa không đáng kể nên người dân cần chủ động cung cấp đủ nước cho ruộng lúa đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 28.0-31.0 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ 23-29°C,

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây tuy nhiên giai đoạn phát triển quả của cây cần cung cấp đủ nước thì cây ăn trái mới cho quả nhiều nước và ngọt, do đó trong tuần người dân cần bổ sung đủ nước cho cây trồng đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ngô	Xuân	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 25-28°C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.0 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 4.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần phù hợp cho ngô phát triển giai đoạn này; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.0 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 4.4mm, cây nhãn đang thời kỳ phát triển quả do đó nước là một trong những yếu tố quan trọng cho giai đoạn phát triển này, tuần này có tổng lượng mưa thấp nên người dân cần tưới bổ sung đủ nước cho nhãn đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như trừ sâu thích hợp cho nhãn.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.0 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 4.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát và ưa ánh sáng tán xạ, giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 4 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: dùng cây che mát, tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè sâu nở rộ.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.5 - 26.5 độ C, lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy nhiệt độ tương đối phù hợp cho rau màu phát

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			triển. Tuy nhiên cần đảm bảo tưới bổ sung đủ nước cho rau màu đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Cây lạc xuân	Xuân	Đâm tía - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.0 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.1°C, tổng lượng mưa là 4.4mm, thời kỳ phát triển này của lạc cần cung cấp đủ khoáng chất và nước tưới, số liệu khí tượng cho thấy tổng lượng mưa trong tuần thấp, do đó người dân cần tưới nước thường xuyên cho diện tích lạc đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 19.0-21.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.5-26.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt thích hợp cho cây trồng phát triển tuy nhiên cũng là điều kiện thích hợp cho sâu bệnh phát triển, do đó người dân cần chủ động sử dụng các biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**